



編  
號

47

名  
稱

核醫陰囊攝影  
(Scrotal Imaging)

修訂日期

2019/09/20

修訂版次

第9版

主要目的

- 一、睪丸扭轉、睪丸壞死之評估。
- 二、副睪丸炎之評估。

檢查流程

1. 核醫科櫃檯報到後，請至休息區稍候，輪到您時，會有人呼叫您的名字，並通知您先解小便，再至造影室。
2. 依指示平躺於檢查床，醫護人員會由靜脈注射核醫藥物：Tc-99m pertechnetate。
3. 注射核醫藥物後，隨即進行陰囊造影，整個檢查需時約30分鐘。有時會因每個人情形不同，由醫師決定間隔10-30分鐘後再加照局部造影。
4. 為了影像清晰，我們將需要固定您的陰囊。請放心，造影檢查時，只需靜靜躺著，並不會使你感到不舒服。
5. 若有需要，會進行單光子斷層掃描(360度掃描)，時間約30分鐘。



注意事項

1. 本項檢查前並不需特別的準備，不需禁食。
2. 建議於檢查後多喝水、多上廁所，以促進核醫藥物的排泄。
3. 造影檢查過程，並不會痛苦，請儘量不動，如此可以提高影像的品質。
4. 本項檢查罕見有過敏等副作用。
5. 本項檢查所用藥物雖具放射性，其半衰期只有6小時且非常微量。基本上並不會對您或家人造成傷害，請放心。但為維護兒童與孕婦之權益，注射後24小時內請盡量減少近距離相處（一公尺以內稱近距離）。

有任何疑問歡迎與核醫科聯絡：

聯絡電話：04-23592525轉4801

Email：nm@vghtc.gov.tw