



編號

23

名稱

核醫胃-食道逆流掃描
(Enterogastroesophageal Reflux)

修訂日期

2019/09/20

修訂版次


第9版

主要目的

- 一、評估胃-食道逆流的情形及嚴重度。
- 二、評估是否有逆流物吸入肺臟的情形。

檢查流程

1. 造影檢查前至少禁食 4 小時以上。
2. 核醫科櫃檯報到後，請至休息區等候，會有人呼叫您的名字，通知您解小便，再至核醫造影室。
3. 在造影室喝入約500c.c.含核醫藥物 (Tc-99m DTPA) 的開水。
4. 先平躺檢查床進行一次胸部造影。
5. 隨後會在您的腹部加壓，再進行一次胸部造影。目的是增加檢查的靈敏度。
6. 造影檢查時，只需靜靜躺著，並不會痛苦。整個檢查約需半小時。
7. 如有評估逆流物吸入肺臟需要時，技術員會再與您約1-2小時之後加做胸部局部造影。



注意事項

1. 若您有懷孕的可能，可能暫時不宜進行本項檢查，請事先告知我們。
2. 建議不要穿戴有金屬物的衣服及配件(如：項鍊)。
3. 建議於檢查結束後多喝水、多上廁所，以促進核醫藥物的排泄。
4. 在造影前先解小便，請注意避免尿液污染到衣褲及皮膚。
5. 造影檢查過程，並不會痛苦，請儘量不動，如此可以提高影像的品質。
6. 本項檢查罕見有過敏等副作用。
7. 本項檢查所用藥物雖具放射性，其半衰期只有6小時且非常微量，基本上並不會對您或家人造成傷害，請放心。但為維護兒童與孕婦之權益，檢查24小時內請盡量減少近距離相處（一公尺以內稱近距離）。

有任何疑問歡迎與核醫科聯絡：

聯絡電話：04-23592525轉4801

Email：nm@vghtc.gov.tw