





編號	67	名稱	<p align="center"><b>核醫心臟類澱粉沉積症掃描 (Tc-99m PYP Heart Scan)</b></p>	修訂日期	2021/06/29
				修訂版次	第1版
主要目的	<p>一、協助區別心臟類澱粉沉積症的類型。 二、評估全身關節是否受到疾病侵犯。</p>				
檢查流程	<ol style="list-style-type: none"> <li>核醫科櫃檯報到後，請至休息區稍候，輪到您時，會有人呼叫您的名字。</li> <li>先至注射室接受靜脈注射核醫藥物：Tc-99m PYP。</li> <li>注射核醫藥物後，再由醫護人員約定造影的時間（需造影兩次，分別是注射藥物完1小時及3小時之後，等候期間可自行活動，並可以進食）。</li> <li>依約定時間至休息區等候照相，輪到您時，技術師會呼叫您的名字，並通知您先解小便。</li> <li>造影檢查時，只需靜靜躺著，並不會痛苦。造影從頭照到腳，約需時20分鐘。</li> <li>若有需要，會進行單光子斷層掃描(360度掃描)，時間約30分鐘。</li> <li>完成第一次造影後，會通知第二次造影時間(約為注射藥物完3小時之後)，掃描過程與第一次造影相同。</li> </ol>				
	 				
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>若您有懷孕的可能，可能暫時不宜進行本項檢查，請事先告知我們。</li> <li>本項檢查前並不需特別的準備，不需禁食。</li> <li>建議不要穿戴有金屬物的衣服及配件(如：項鍊)。</li> <li>建議於注射後多喝水、多上廁所，以促進核醫藥物的排泄。</li> <li>在造影前先解小便，請注意避免尿液污染到衣褲及皮膚。</li> <li>造影檢查過程，並不會痛苦，請盡量不動，如此可以提高影像的品質。</li> <li>本項檢查罕見有過敏等副作用。</li> <li>本項檢查所用藥物雖具放射性，其半衰期只有6小時且非常微量，基本上並不會對您或家人造成傷害，請放心。但為維護兒童與孕婦之權益，注射後24小時內請盡量減少近距離相處（一公尺以內稱近距離）。</li> </ol>				
<p>有任何疑問歡迎與核醫科聯絡： 聯絡電話：04-23592525轉4801      Email：nm@vghtc.gov.tw</p>					