



編  
號

44  
A

名  
稱

核醫餘尿及尿路逆流檢查  
(Scan of Residual Urine, UV-Reflux)

修訂日期

2022/06/13

修訂版次

第7版

主要目的

- 一、評估是否有尿路逆流。
- 二、評估解尿後膀胱的餘尿量等等。

檢查流程

1. 櫃檯報到後，會先請您放置導尿管（嬰幼兒請至小兒科，若有需要帶路或其他協助，請讓我們知道，另本科亦備有輪椅可供您使用。）。
2. 回來後會接點滴至導尿管，將核醫藥物經由點滴輸液套管加入膀胱中。
3. 點滴不滴時即表膀胱已充滿，此時請告知技術人員，並讓受檢者躺至檢查台上，開始造影。造影檢查時，只需靜靜躺著，並不會痛苦。
4. 第一次造影結束後，請受檢者解尿後再度進行造影。
5. 整個造影約需時30分鐘（依受檢者的配合度不等）。



注意事項

1. 接受核醫餘尿及尿路逆流檢查時，衣物可能會被尿液污染，請多準備一套衣物及尿片。
2. 因放置導尿管的緣故，少數受檢者會有些微血尿的現象，此情形會漸漸改善，若2日後仍持續或是出血量大，請諮詢您的醫師。
3. 本檢查所用藥物雖具放射性，其半衰期只有6小時且非常微量，基本上並不會對您或家人造成傷害，請放心。但為維護兒童與孕婦之權益，注射後24小時內請盡量減少近距離相處（一公尺以內稱近距離）。
4. 其他則無特別之注意事項，並且罕見有過敏等副作用。

有任何疑問歡迎與核醫科聯絡：

聯絡電話：04-23592525轉4801

Email：nm@vghtc.gov.tw