




編 號	09	名 稱	碘-131甲狀腺攝取率及掃描 (I-131 Thyroid Uptake and Scan)	
			修訂日期	2019/09/20
			修訂版次	第15版

主要目的	<p>一、鑑別診斷甲狀腺功能亢進。</p> <p>二、甲狀腺組織的定位及功能的評估。</p>
------	--

檢查流程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢查前若有接受含碘對比劑的注射[如:電腦斷層(CT)、心導管檢查、血管攝影、腎臟腎盂檢查(IVP)、支氣管攝影(Bronchogram)等放射性檢查]，應間隔1至2個月以上。 2. 治療前14天至隔天檢查完成，開始限碘飲食（請見背面限碘飲食衛教）。並請選用無碘鹽(如意精鹽)，每日飲食含碘量需低於100微克。 3. 停藥：抗甲狀腺素藥物請停1週以上。其他藥物視狀況而定。 4. 檢查前先至少禁食2小時。 5. 核醫科櫃檯報到後，請至休息區稍候，輪到您時，會有人呼叫您的名字。 6. 先至熱核室接受口服核醫藥物：碘-131膠囊。 7. 由櫃檯人員約定造影的時間（須等候至隔日下午）。 8. 依約定時間至核醫科休息區等候照相，輪到您時，技術師會呼叫您的名字，通知您先解小便，再至造影室。 9. 造影檢查時，只需靜靜平躺於檢查床。時間約20分鐘。
------	---



注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 若您有懷孕的可能，可能暫時不宜進行本項檢查，請事先告知我們。 2. 碘-131可經由乳腺分泌，哺乳婦女若接受檢查，建議停止哺乳。 3. 檢查完2小時之後即可恢復甲狀腺用藥及正常飲食。 4. 建議於服藥後多喝水、多上廁所，以促進核醫藥物的排泄。 5. 在造影前先解小便，請注意避免尿液污染到衣褲及皮膚。 6. 造影檢查過程，並不會痛苦，請儘量不動，如此可以提高影像的品質。 7. 本項檢查罕見有過敏等副作用。 8. 本檢查所用藥物雖具放射性(半衰期為8天)，但非常微量，基本上並不會對您或家人造成傷害，請放心。但為維護兒童與孕婦之權益，基於輻射越低越好的原則，給藥後3日內請盡量減少近距離相處（一公尺以內稱近距離）。之後則無此限制。
------	---

有任何疑問歡迎與核醫科聯絡：

聯絡電話：04-23592525轉4801

Email：nm@vghtc.gov.tw

限碘飲食衛教

食物分類	可以食用	避免食用
鹽及調味料	新鮮或乾香料、白醋、無鹽調味粉、無碘鹽(如意精鹽) 	海鹽、加碘鹽、烏醋、醬油、魚露、蕃茄醬等各式醬料、加鹽調味粉。
海產及海中植物	無。	海魚、貝、蝦、蟹、海帶、海菜、紫菜、洋菜。
全穀類及加工品	五穀雜糧(米、麵粉)、未加鹽麵條、未加鹽各種穀類。	加碘鹽的烘培食品、麵包、餅乾、糕點、麵條、麵線、加鹽各種穀類脆片。
乳製品	鮮乳、優格(每日限一杯250cc)。	奶酪、乳酪、冰淇淋、含牛奶成份糕點、布丁、奶油。
巧克力	純黑巧克力、純可可粉。	牛奶巧克力。
黃豆及製品	豆腐、豆漿、新鮮毛豆、黃豆。	豆乾、味噌、納豆、豆奶、醬油。
肉類	新鮮未加工肉類。	肉鬆、肉乾、培根、香腸、熱狗、火腿、肉品罐頭。
蛋類	全蛋(每日限一顆)。	蛋黃或含蛋黃製品，如蛋糕、美乃滋。
油脂及堅果類	所有烹調用植物油(如大豆油)、無鹽人造奶油、無鹽堅果類、無鹽花生醬。	加鹽核果類、加鹽花生醬、加鹽人造奶油。
蔬果類	新鮮蔬菜、水果。	含有紅色素水果罐頭加工品、醃漬蔬菜、醬菜。
其他	糖、蜂蜜、果醬、現泡茶、現煮咖啡、汽水、果汁	含紅色素糖果及果凍等、含來自海洋原料之營養補充品(如沙魚軟骨素)、含碘的維他命與營養補充品。
	1. 避免食用含有紅色食用色素 3 號食品或藥品，如紅/橘色糖果、果凍或藥品。 2. 避免食用含碘維他命或食物補充品，如綜合維他命、鯊魚軟骨素。 3. 服用碘-131 後宜多喝水促進代謝，以減低體內輻射劑量。 4. 飲食若有疑問請洽詢營養諮詢門診： 門診大樓前棟 7 樓 2708 診、每週一到週五 9:00~12:00、(04)23592525#2601。	