# 常規的住院醫囑

2004/01(制定)

2013/04(審)

<u>監測生命徵象</u>

On pulse oximeter，並依病人狀況設定好預期的 SaO2 值
(ICU 不可開立 on EKG monitor)

<u>水分</u>

- 決定每天的水分總量
- 決定進食與否
- 給予適當的輸液:
  決定葡萄糖的濃度，是否給予電解質
  輸液速度 Rate
- 小於一公斤者開立保溫箱的設定溼度 (85-90%)

| 實驗室檢查 | 適應症 |
|---|---|
| • 血型<br>• 血型配對 | 考慮輸血或換血者 |
| • CBC, D/C, platelet | 考慮敗血症 |
| • Hemoglobin/Hematocrit | 貧血/紅血球過多症 |
| • Blood culture | 考慮敗血症 |
| • Urine toxicology screen | R/O maternal substance abuse |
| • Blood gases | 呼吸窘迫; 發紺 |
| • 電解質 | 通常在出生 12 小時後; 如有臨床需要可以更早檢查 |
| • 血糖 | 有高或低血糖危險因子的嬰兒;如 SGA, LGA |

| 藥物 | 適應症 |
|---|---|
| • Vitamin K 1.0 mg IM x 1<br>(0.5 mg for <1,000 gm) | 避免新生兒出血性疾病 |
| • Ampicillin 及 Gentamicin | 懷疑敗血症 |
| • B 型肝炎免疫球蛋白 | 母親 HBsAg 及 HBeAg 皆陽性者 |
| • B 型肝炎疫苗 | 體重達 2000 公克者 |