

預防子宮頸癌，你應該施打疫苗！

文／臺中榮總家庭醫學部主治醫師 王淳理

臺中榮總家庭醫學部醫師 陳羿蒨

家庭醫學部 王淳理 醫師



【主治專長】

家庭醫學、安寧緩和醫療、預防醫學、健康管理與諮詢、戒菸、骨質疏鬆

【門診時間】

王淳理醫師 - 週二上午

陳羿蒨醫師 - 週一上午、周二下午
週五上午

子宮頸癌為女性常見癌症之一，又以25-45歲的婦女最為常見。子宮頸癌主要因性行為感染人類乳突狀病毒（Human PapillomaVirus，簡稱HPV），導致子宮頸慢性發炎，進而轉變為癌細胞。

人類乳突病毒分為低風險型與高風險型。低風險型HPV如第6及第11型，常見與男女性生殖器疣（俗稱菜花）較相關，致癌機率較低；高風險型HPV如第16、18、31、33型，則與子宮頸癌以及外生殖器癌較相關。

HPV疫苗可預防60-90%的HPV感染，又以未曾有過性行為的族群效果最好。完整接種後，可提供6-12年不等的保護力。人體也不會因為接種HPV疫苗而感染HPV病毒。

目前全球共有3支HPV疫苗，分別為二價疫苗「保蓓（Cervarix）」、四價疫

苗「嘉喜（Gardasil）」及九價疫苗「嘉喜9（Gardasil 9）」。

疫苗名稱	保蓓 Cervarix 二價	嘉喜 Gardasil 四價	嘉喜 Gardasil 九價
病毒型	HPV16、18	HPV6、11、16、18	HPV6、11、16、18、31、33、45、52、58
接種次數（時程）	三劑 （第0、第1、第6個月）	三劑 （第0、第2、第6個月）	三劑 （第0、第2、第6個月）
建議對象	15-25 歲女性	9-26 歲男女性 27-45 歲女性	9-45 歲男女性
價格	約 4000 元 / 劑	約 4000 元 / 劑	約 5500 元 / 劑

註：9-14歲可僅接種兩劑

曾對疫苗有過敏史、患有中度或重度急性疾病、患有特殊疾病史（如：出血性凝血問題、免疫功能異常或正服用免疫抑制劑）、及懷孕婦女不適合接種HPV疫苗，請諮詢您的家庭醫學科醫師。

接種疫苗後，仍需注意安全性行為及定期接受子宮頸抹片檢查，以提供子宮頸癌的必要預防。

以上疫苗接種建議為現行疾管署政策，可能會隨時間修改，歡迎洽詢家庭醫學科醫師。🏥