

癌症病人能不能施打疫苗？

醫：建議施打，並依照療程定期治療

文／臺中榮總癌症防治中心主任 李旭東

整合性癌症資源中心
李旭東 主任



【主治專長】

1. 帕金森症及頑固型疼痛之治療 2. 癲癇手術及電刺激治療 3. 腦中風，顱內動脈瘤及動靜脈畸形手術 4. 內視鏡腦下垂體腫瘤手術 5. 三叉神經痛及顏面神經痙攣 6. 脊椎神經手術 7. 內視鏡脊椎手術 8. 脊椎高頻熱凝療法手術 9. 脊椎骨水泥灌漿手術 10. 椎間盤突出微創手術 11. 頸內 - 頸外動脈吻合手術

【門診時間】

週二下午，2411 診間

週四上午，2410 診間

癌症治療延期，恐增加癌症死亡率

新冠肺炎疫情嚴峻，癌症病人感染風險較一般人高，染疫後更是容易導致重症或死亡，部分癌友因此而害怕就醫，然而癌症治療卻不可延誤。根據系統性回顧研究，癌症治療每延遲4週，無論是手術、放射治療還是藥物治療（如化療或免疫療法），癌症死亡率都可能增加6%至8%。疫情期間，癌友不免擔心感染風險，但癌症進展對身體造成的威脅，更是不容小覷，癌友應安全

且按時就醫，避免延誤診斷及治療。

施打疫苗時機要注意，建立周全保護力

另國內COVID-19疫苗陸續開始施打，「癌症病人能不能施打新冠肺炎疫苗」也成為癌友熱烈討論的話題。目前醫學證據指出，疫苗副作用發生機率並不會因罹患癌症而增加，疫苗對於國內出現的Alpha、Delta變異株有一定的保護力，而癌症病人為COVID-19併發症高風險族群，建議癌症病人均應接種疫

苗，為建立周全防護，主要照顧者及同住人也應接種疫苗。中榮癌症防治中心參考國家綜合癌症網絡（National Comprehensive Cancer Network, NCCN）建議之疫苗接種指引，整理如附圖。提醒「每位癌症病人因疾病、接受療程及身體情況有所不同，建議可先與醫師討論，等到能夠接種時，能在合適時機完成疫苗接種，完成自我保護。」

癌症治療不能等，安心就醫在中榮

中榮提供安心就醫環境，院區入口設有旅遊史查檢站並監測體溫。而住院

的病人與陪客者皆會進行PCR採檢。以下提供癌友，安全就醫六撇步：（1）做好自我防護，正確配戴口罩。（2）室內與人保持1.5公尺距離。（3）盡可能避免醫療院所內飲食，若需長時間治療者，建議尋找空曠無人處，盡快用餐。（4）善用中榮APP查詢看診、計價、領藥進度，縮短停留醫院時間。（5）減少碰觸醫院設施。（6）勤洗手，國建署建議「三前三後」洗手時機，三前就是用餐前、與病人觸碰前、看病前，三後則是看病後、擤鼻涕後、上廁所後。🏥

臺中榮民總醫院
Taichung Veterans General Hospital

疫苗接種

癌症病人
施打新冠肺炎疫苗原則

治療種類	施打新冠肺炎疫苗建議
自體幹細胞移植 異體幹細胞移植	治療結束後三個月
細胞治療 (CAR T-cell 或 NK cell)	治療結束後三個月
正接受化學治療	待嗜中性白血球恢復後
正接受標靶治療	可隨時施打
正接受免疫治療	可隨時施打(若是免疫風濕科疾病病人，建議與該科主治醫師討論)
正接受放射治療	可隨時施打
重大手術後	術後數週後施打
治療結束進入追蹤期	可隨時施打

參考NCCN guideline

➢ 以上為通則，建議治療中癌症病人請與主治醫師討論，追蹤期癌症病人若有衛福部疾管署公告之注意情況與禁忌症，也需與醫師討論評估。

✓ 衛生福利部疾病管制署：
[接種對象與期程、注意事項\(點下去或掃QR code\)](#)

9

掃描QR code獲得更多癌症病友與新冠肺炎相關內容。