

臺中榮總尖端醫療系列

異常出血請注意子宮內膜癌 達文西微創內視鏡手術

子宮內膜癌的病灶生長在子宮腔內，早期就會因病人在非經期或停經後的異常出血而被察覺。手術對早期內膜癌有非常好的治療效果，絕大部分早期內膜癌患者不用再接受後續化療與放射線治療。

根據 2020 年統計，歷年來於本院接受微創手術之臨床第一期子宮內膜癌病人，5 年存活率 99.4%。相較兩個國際大型臨床試驗的結果 (LAP2: 5 年存活率 89.8%，LACE: 5 年存活率 96%)，結果更為超群。



婦女醫學部堅強手術團隊

| 傳統開腹癌症分期手術 | 達文西微創內視鏡手術 |
|--------------|---------------------|
| 15-20 公分的大傷口 | 術中出血更少 |
| 術中出血較多、傷口疼痛 | 出血少、疼痛輕，數個小於 1 公分傷口 |
| 術後長時間的臥床及禁食 | 術後 2-3 日即可出院 |
| 手術根除效果佳 | 手術根除效果佳 |

| | | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 |
|-------------|-----|----|----|----|-----|----|
| 婦癌科 醫師門診 | 呂建興 | | 上午 | | 上午 | |
| | 許世典 | 上午 | | | | 上午 |
| | 孫珞 | 上午 | | | 上下午 | |