

皮膚相關的免疫調節劑是否需要因為疫苗調整



文／臺中榮總皮膚科主治醫師 翁毓菁

很多病人想問，如果原本有在使用免疫用藥，施打新冠肺炎疫苗時，需要停止使用藥物來達到較高的疫苗效力嗎？以下一至四項藥物／治療都不會有影響。

1.外用乳膏：各種治療皮膚症狀外用乳膏

2.照光治療：UVA, UVB, 準分子雷射

3.生物製劑：TNF抑制劑（恩博，復邁，欣普尼）；IL-17抑制劑（可善挺，達癬治）；IL-12/23抑制劑（喜達諾；IL-23抑制劑（特諾雅，喜開悅）；IL4/13抑制劑（杜避炎）；IgE抑制劑（喜瑞樂）；中高劑量類固醇（prednisolone \geq 20毫克/天）

4.口服藥物：Sulfasalazine；Leflunomide；Mycophenolate；Azathioprine；Cyclosporine

5.但是，如果你使用的免疫藥物是Methotrexate（MTX,滅殺除癌錠）跟JAK抑制劑（捷抑炎，愛滅炎），施打疫苗後要停止使用藥物一週！

每個病人的個別狀況都不同，建議有在使用免疫調節藥物的民眾，施打疫苗前，先與您的主治醫師共同討論。



皮膚科用藥是否可接種新冠肺炎疫苗

皮膚免疫調節劑：乾癬、異位性皮膚炎、白斑

施打疫苗後不需調整藥物

- 外用藥膏**
各種治療皮膚症狀外用乳膏
- 照光治療**
UVA, UVB, 準分子雷射
- 生物製劑**
抗腫瘤壞死因子
Anti-IL-6, IL-17, IL-12/23,
IL-23, IgE等
如需了解細項，詳見文字
- 口服藥物**
Cyclosporine, Sulfasalazine,
Leflunomide, Acitretin,
Mycophenolate

施打疫苗後調整藥物使用

- 口服藥物**
Methotrexate(MTX,滅殺除癌錠)
JAK抑制劑

M E M O

每個病人的個別狀況都不同，建議有在使用免疫調節藥物的民眾，施打疫苗前，先與您的主治醫師共同討論

翁毓菁 皮膚專科/醫美專家
Yu-Ching Wong