



臺中榮民總醫院  
Taichung Veterans General Hospital

# 甲狀腺腫瘤 治療新趨勢

甲狀腺結節盛行率為 50%-70%，有症狀（異物感、吞嚥不適）或造成生活困擾者可以選擇燒灼（消融）治療。跟傳統的手術治療方式相比，燒灼（消融）治療不用住院，做完觀察半小時就可以回家。如果是充滿液體的甲狀腺結節，俗稱甲狀腺囊腫，可以考慮酒精注射，減少甲狀腺囊腫反復抽吸的機會。副甲狀腺的問題，如機能亢進合併高血鈣者，也可考慮燒灼（消融）治療。

## ■ 軟組織射頻腫瘤燒灼術 ■

**適用疾病** 良性甲狀腺結節、無法手術的甲狀腺癌復發、副甲狀腺亢進

**優點** 傷口小，恢復快、局部麻醉，無需住院，保留正常甲狀腺腺體

治療前



治療後



## ■ 經皮甲狀腺腫瘤酒精注射 ■

**適用疾病** 甲狀腺囊腫

**優點** 傷口小，局部麻醉，無需住院

治療前



治療後



### 李宇璇 醫師

新陳代謝科 | 週二下午、週五上午

- ✓ 軟組織射頻腫瘤燒灼術
- ✓ 經皮甲狀腺腫瘤酒精注射
- ✓ 甲狀腺腫瘤消融專業證照



### 鄭由承 醫師

新陳代謝科 | 週一上午、週五下午

- ✓ 經皮甲狀腺腫瘤酒精注射