



編
號

52

名
稱

核醫錄-67腎臟發炎掃描
(Ga-67 Scan for Renal Inflammation)

修訂日期

2025/03/07

修訂版次

第11版

主要目的

- 一、偵測是否有腎臟發炎之情形。
- 二、評估腎臟發炎之嚴重程度。

檢查流程

1. 核醫科櫃檯報到後，請到叫號機插健保卡抽取號碼牌，並請依照語音指示進行後續檢查流程，先至注射室插卡報到，再至休息區等候。
2. 輪到您時，叫號系統會呼叫您的號碼，先至注射室接受靜脈注射核醫藥物：鎩-67。
3. 注射核醫藥物後，再由醫師約定造影的時間（通常是注射日算第一日，第三日回來造影），但部分疑似炎症病患可能提前造影(第二日)或增加造影的次數(即除第三日外，再加照第四日或第五日)。
4. 依約定時間回到本科，至第4造影室報到機插卡報到，再至休息區等候造影。
5. 輪到您時，叫號系統會呼叫您的號碼，並通知您先解小便。
6. 如廁後請至造影室，依放射師指示平躺於檢查床，進行胸部造影，需時約15分。
7. 若有需要，會進行單光子斷層掃描(360度掃描)，時間約30分鐘。



注意事項

1. 若您有懷孕的可能，可能暫時不宜進行本項檢查，請事先告知我們。
2. 使用鐵劑之病人，需間隔一週以上再進行鎩-67檢查。
3. 使用Gadolinium(Gd)進行核磁共振(MRI)檢查之病人需間隔24小時以上再進行鎩-67檢查。
4. 鎩-67可經由乳腺分泌，哺乳婦女若接受檢查須停止哺乳至少2週。
5. 化學治療將減低腫瘤組織對鎩-67之攝取量，最好於治療後3週以上再進行檢查
6. 本項檢查前並不需特別的準備，**不需禁食**。藥物會經由腸胃道代謝，檢查期間可以多食用青菜水果等食物幫助腸胃道蠕動。
7. 建議不要穿戴有金屬物的衣服及配件(如：項鍊)。
8. 建議於注射後多喝水、多上廁所，以促進核醫藥物的排泄。
9. 造影檢查過程，並不會痛苦，請儘量不動，如此可以提高影像的品質。
10. 本項檢查罕見有過敏等副作用。
11. 本項檢查所用藥物雖具放射性，但非常微量，基本上並不會對您或家人造成傷害，請放心。但為維護兒童與孕婦之權益，給藥後三日內請盡量減少近距離相處（一公尺以內稱近距離）。

有任何疑問歡迎與核醫科聯絡：

聯絡電話：04-23592525轉4801 Email：nm@vghtc.gov.tw