

			臺 中 榮 民 總 醫 院 Taichung Veterans General Hospital		核子醫學科 衛 教 單	
編號	47	名稱	核醫陰囊攝影 (Scrotal Imaging)		修訂日期	2025/01/01
					修訂版次	第11版
主要目的		一、睪丸扭轉、睪丸壞死之評估。 二、副睪丸炎之評估。				
檢查流程		- 核醫科櫃檯報到後，請到叫號機插健保卡抽取號碼牌，並請依照語音指示進行後續檢查流程，先至第4造影室報到機插卡報到，請再回休息區等候。 - 輪到您時，叫號系統會呼叫您的號碼，通知您解小便，再至造影室。 - 如廁後請至造影室，依放射師指示平躺於檢查床，醫護人員會由靜脈注射核醫藥物：Tc-99m pertechnetate。 - 注射核醫藥物後，隨即進行陰囊造影，整個檢查需時約30分鐘。有時會因每個人情形不同，由醫師決定間隔10-30分鐘後再加照局部造影。 - 為了影像清晰，我們將需要固定您的陰囊。請放心，造影檢查時，只需靜靜躺著，並不會使你感到不舒服。 - 若有需要，會進行單光子斷層掃描(360度掃描)，時間約30分鐘。				
						
注意事項		- 本項檢查前並不需特別的準備，不需禁食。 - 建議於檢查後多喝水、多上廁所，以促進核醫藥物的排泄。 - 造影檢查過程，並不會痛苦，請儘量不動，如此可以提高影像的品質。 - 本項檢查罕見有過敏等副作用。 - 本項檢查所用藥物雖具放射性，其半衰期只有6小時且非常微量。基本上並不會對您或家人造成傷害，請放心。但為維護兒童與孕婦之權益，注射後24小時內請盡量減少近距離相處（一公尺以內稱近距離）。				
有任何疑問歡迎與核醫科聯絡： 聯絡電話：04-23592525轉4801 Email：nm@vghtc.gov.tw						