

台中榮民總醫院  
內部過敏免疫風濕科

此處刷卡用

類風濕性關節炎特別紀錄表(一)

健保榮民	健保員工	健 保	健保員眷	民 眾	
姓名			病房	床位	年齡
				病歷號	

類風濕性關節炎診斷要件(1987)

( ) 1.晨間關節僵硬

晨間關節僵硬，至少需要一個小時 才能獲得最大改善。

晨間關節僵硬時 持續時間目前約 \_\_\_\_\_ 小時，(分)已有 \_\_\_\_\_ (星期，月，日)

以前最長的持續時間曾達 \_\_\_\_\_ 小時。

( ) 2.關節炎，至少波及三個區域

至少有三個區域的關節同時發炎、關節積水和周圍組織腫脹，必須由醫師親自觀察到才算，

這十四個關節區包括：

	PIP	MCP	Wrist	Elbow	Knee	Ankle	MTP
右							
左							

\*直接在空格內填入每個關節發炎時間已有多久。

( ) 3.手部關節炎

在雙手腕關節、腕指關節(MCP)及近端指間關節(PIP)六個區域中，至少有一區域的關節產生腫脹。

	Wrist	MCP	PIT
右			
左			

\*直接在空格內填入每個關節發炎時間已有多久。

( ) 4.對稱性關節炎

在身體兩側對稱的關節區同時產生關節炎(腕關節，指腕關節及近端指間關節不一定要完全對稱)。

PIP \_\_\_\_\_ MCP \_\_\_\_\_ Wrist \_\_\_\_\_ Elbow \_\_\_\_\_ MTP \_\_\_\_\_ Ankle \_\_\_\_\_ Knee \_\_\_\_\_

\*如有對稱性請打(√)，沒有對稱性打(×)

Date: \_\_\_\_\_ Signature: \_\_\_\_\_

( ) 5.類風濕性結節(Rheumatoid Nodule)

底下小結，多半在骨頭突出處，身體的伸側，或是靠近關節附近的區域，必須由醫師親自觀察到才算。

	Auricle	Buttock	Achill tendon	PIP	Elbow
右					
左					

Occipital \_\_\_\_\_ Back \_\_\_\_\_ Others \_\_\_\_\_

\*如有小結請打(√)，沒有小結打(×)

( ) 6.血清風濕因子(Rheumatoid Factor)

台中榮總結果:Latex Slide 方法:\_\_\_\_\_

Xephelometry 方法:\_\_\_\_\_ unit

其他醫院結果:用什麼方法\_\_\_\_\_

效價\_\_\_\_\_

( ) 7.X光變化

手部 X 光攝影檢查，有骨骼皮質腐損和靠近關節處的骨質疏鬆。

	PIP	MCP	Wrist
右			
左			

\*如有皮質腐損請填入 (E) rosion

骨質疏鬆請填入 (O) steoporosis

上述七點，如有四點符合，病人就是類風濕性關節炎，必須注意第一點至第四點必須持續六星期以上才可。

Radiographic staging system for R A

( ) Stage I: Xo destructive changes ; periarticular osteopenia may be present.

( ) Stage II: Osteoporosis is definite , with or without slight subchondral bone destruction ; slight joint space narrowing may be present.

( ) Stage III: Evidence for cartilage and bone destruction ; joint deformity(e.g. , subluxation , ulnar deviation ) ; no bony or fibrous ankylosis.

( ) Stage IV: Stage 3 criteria plus fibrous or bony ankylosis.