

臺中榮總不宜磨粉藥品清單

2021/3 更新

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
HIR02	Hiros cap 5/120mg	Cetirizine/Pseudoephedrine 5/120	喜洛緩釋微粒膠囊	緩釋微粒膠囊	緩釋微粒膠囊，請整粒吞服，勿咬碎或磨粉使用
AC910	(錠)Klaricid tab 500mg	Clarithromycin tab 500mg	開羅理黴素膜衣錠	膜衣錠	有特殊味道，建議整粒吞服。
KLA02	Klarith tab 500mg	Clarithromycin tab 500mg	克羅利黴素膜衣錠 500 公絲	膜衣錠	有特殊味道，建議整粒吞服。
CUR04	Curam Film-coated tab 1000mg	Amoxil 875mg+Clavul. pot 125mg	諾快寧膜衣錠 1000 毫 克	膜衣錠	錠劑需整顆吞服，不可阻嚼。如有需要可將錠劑分開成兩半以利吞服，但不可咀嚼。
BA420	Augmentin tab 1gm	AMOXIL-0.875+CLAVU L.ACID-0.125	安滅菌膜衣錠 1 公克	膜衣錠	錠劑需整顆吞服，不可阻嚼。如有需要可將錠劑分開成兩半以利吞服，但不可咀嚼。
AC210	(錠)Ciproxin tab 250mg	Ciprofloxacin tab 250mg	速博新膜衣錠	膜衣錠	有特殊的味道，建議整粒吞服，可剝半。
SUX01	Suxen tab 250mg	Ciprofloxacin tab 250mg	司淨膜衣錠 250 公絲	膜衣錠	有特殊的味道，建議整粒吞服，可剝半。
AM880	Moxifloxacin tab	Moxifloxacin hcl tab 400mg	威洛速膜衣錠	膜衣錠	有特殊的味道，建議整粒吞服。
TAI01	Taigexyn cap 250mg	Nemonoxacin cap 250mg	太捷信膠囊 250 毫克	膠囊	以水整粒吞服。(仿單)
SAL01	Salazine tab 500mg	Sulfasalazine tab 500mg	撒樂腸溶錠	腸溶錠	腸溶錠勿咬碎，磨粉後會對胃腸道產生刺激性。
SAL05	Salazine tab 500mg	Sulfasalazine tab 500mg	撒樂腸溶錠 500 毫克	腸溶錠	腸溶錠勿咬碎，磨粉後會對胃腸道產生刺激性。
AD890	Doxycycline cap	DOXYCYCLINE HCl EC-CAP 100MG	多喜黴素腸溶膠囊	腸溶微粒膠囊	腸溶微粒膠囊，整顆吞服或可打開膠囊，但不可嚼碎顆粒，避免對胃部產生刺激性。

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
CRE02	Cresemba cap 100mg	Isavuconazole cap 100mg	驅黴霸膠囊 100 毫克	膠囊	須整顆膠囊吞服。勿嚼碎、擠壓、溶解或打開膠囊。可伴隨食物或空腹服用。
POS01	(錠)PosanoL tab 100mg	Posaconazole tab 100mg	波賽特錠劑 100 毫克	錠劑	須整粒吞服，勿剝半、壓碎或咀嚼。
BT530	Free-Terizidon 250mg	TERIZIDON CAP 250MG FREE TB		膠囊	整粒伴隨足夠的水吞服
XRE01	150mg Atazanavir@ cap	ATAZANAVIR@ CAP 150MG	瑞塔滋膠囊 150 毫克	硬膠囊	請隨餐整粒吞服，不可打開膠囊
XA500	200mg Atazanavir@ cap	ATAZANAVIR@ CAP 200MG	瑞塔滋膠囊 200 公	硬膠囊	請隨餐整粒吞服，不可打開膠囊
PRE05	Prezcobix@ tab 800/150mg	Darunavir/Cobicistat@ 800/150mg	普澤力膜衣錠 800/150 毫克	膜衣錠	無法吞嚥整顆錠劑的病人，可使用切藥器將藥切成兩半，切開後應立即服用完整的劑量。
DOV01	Dovato@ tab 50/300mg	Dolutegravir/Lamivudine @50/300mg	洛瓦梭膜衣錠 50/300 毫克	膜衣錠	無法吞嚥整顆錠劑的病人，可使用切藥器將藥切成兩半，切開後應立即服用完整的劑量。
SYM02	Symtuza@ film-coated tab	DRV\cobicistat\FTC\TAF @ tab	信澤力膜衣錠	膜衣錠	無法吞嚥整顆錠劑的病人，可使用切藥器將藥切成兩半，切開後應立即服用完整的劑量。
XK110	Kaletra@ tab	Lopinavir-200+Ritonavir-5 0	快利佳錠	複方膜衣錠	應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
XR500	Norvir@ tab 100mg	Ritonavir@ tab 100mg	諾億亞膜衣錠	膜衣錠	應整顆吞服，不可咀嚼、折斷或壓碎。
XR520	Raltegravir@tab400	Raltegravir@ tab 400mg	宜昇瑞膜衣錠	膜衣錠	膜衣錠需整粒吞服，因 The bioavailability of the chewable tablet is higher: 300 mg chewable tablet (= 400 mg film-coated tablet)

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
VIR01	400mg Viramune@ XR tab	Nevirapine@ XR tab 400mg	衛滋持續性藥效錠 400毫克	持續釋放錠	持續性藥效錠，需整顆吞服，不要剝半、咀嚼或壓碎
XK300	Kivexa@ tab	Abacavir/Lamivudine@ 600/300mg	克為滋膜衣錠	膜衣錠	需整粒吞服（根據 EACS Guidelines, version 10.1, 2020）
BIK01	Biktarvy@ tab	Bictegravir/Emtricitabine/ TAF	吉他韋 膜衣錠	膜衣錠	需整粒吞服，勿咀嚼、壓碎或剝半
XD310	400mg Didanosine@	Didanosine@ EC cap 400mg	惠妥滋持續性膠囊	持續性膠囊	持續性藥效膠囊應整粒吞服
JUL01	Juluca@ tab 50/25mg	Dolutegravir/Rilpivirine	滋若愷膜衣錠	膜衣錠	需整粒吞服（根據 EACS Guidelines, version 10.1, 2020）
DEL05	Delstrigo@ tab 100/300/300mg	DOR/3TC/TDF@ tab 100/300/300mg	達滋克膜衣錠	膜衣錠	需整粒吞服（根據 EACS Guidelines, version 10.1, 2020）
XAT01	Atripla@ tab	Efavirenz/Tenofovir/Emtri citabin	亞翠佩膜衣錠	膜衣錠	需整粒吞服（根據 EACS Guidelines, version 10.1, 2020）
COM03	Complera@ tab 200/25/300mg	Emtricitabine/Rilpivir/Ten ofovir	康普萊膜衣錠	膜衣錠	需整粒吞服，不可以壓碎或溶於液體中，因 RPV 不溶於水。
ODE01	Odefsey@ tab	Emtricitabine/Rilpivirine/T AF	安以斯膜衣錠	膜衣錠	需整粒吞服，不可嚼碎、磨碎或剝開。
XED01	Edurant@ Tab 25mg	Rilpivirine@ tab 25mg	恩臨膜衣錠	膜衣錠	需整粒吞服，不可以壓碎或溶於液體中，因 RPV 不溶於水。
GEN04	Genvoya@ tab	Tenofovir alafenamide /Emtricitabine /Elvitegravir /Cobicistat	捷扶康膜衣錠	膜衣錠	需整粒吞服，勿咀嚼、壓碎或剝半。

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
AV320	ValCYTE tab 450mg	Valganciclovir tab 450mg	克毒癒膜衣錠	膜衣錠	應整粒吞服，不可剝半或嚼碎，致畸胎可能；避免直接 皮膚接觸。
SOV01	Sovaldi tab 400mg	Sofosbuvir tab 400mg	索華迪 400 毫克	膜衣錠	有苦味，建議整粒吞服
ZEP01	Zepatier tab 50/100mg	Elbasvir/Grazoprevir tab50/100mg	賀肝樂膜衣錠	膜衣錠	需整粒吞服，且應保存於原本的泡囊包裝中，待使用時再取出，以 避免接觸濕氣。
MAV01	Maviret tab 100mg/40mg	Glecaprevir/Pibrentasvir10 0/40mg	艾百樂膜衣錠 100 毫 克/40 毫克	膜衣錠	需整粒吞服，要服用時才將藥物從包裝中取出。
HAR02	Harvoni tab 90/400mg	Ledipasvir,Sofosbuvir 90/400mg	夏奉寧膜衣錠	膜衣錠	需整粒吞服
EPC01	Epclusa tab 400/100mg	Sofosbuvir,Velpatasvir 400/100mg	宜譜莎膜衣錠	膜衣錠	本品帶有苦味，建議不要將膜衣錠嚼碎或研碎使用，需整粒吞服。
PRE11	Prevmis F.C.tab 240mg	Letermovir F.C.tab 240mg	減巨斯膜衣錠 240 毫 克	膜衣錠	可隨食物或不隨食物服用，需整粒吞服不可嚼碎
FRO01	Frothin tab 250mg	Metronidazole tab 250mg	服樂淨腸溶糖衣錠 250 毫克	腸溶糖衣錠	腸溶糖衣錠，需整粒，不可剝開、咀嚼或磨粉
ALP03	(專案) 200mg Alpelisib tab	Alpelisib tab 200mg		錠劑	需整粒吞服，不可剝半、壓碎或咀嚼
ALP02	(專案) 50mg Alpelisib tab	Alpelisib tab 50mg		錠劑	需整粒吞服，不可剝半、壓碎或咀嚼
KIS01	(FREE) Kisqali tab 200mg	FREE-Ribociclib tab 200mg	擊癌利 200 毫克	膜衣錠	Ribociclib 藥錠應整顆吞服(吞服前不可咀嚼、壓碎或剝開藥錠)。 藥錠若裂開、破碎或不完整，請勿服用。
KIS02	Kisqali tab 200mg	Ribociclib tab 200mg	擊癌利 200 毫克	膜衣錠	Ribociclib 藥錠應整顆吞服(吞服前不可咀嚼、壓碎或剝開藥錠)。 藥錠若裂開、破碎或不完整，請勿服用。

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
LON03	15mg Lonsurf tab	Trifluridine/Tipiracil 15mg	朗斯弗膜衣錠 15 毫克	膜衣錠	膜衣錠應整顆吞服，請勿咀嚼、咬碎。管灌：投入適量的溫水中(22~55°C)，約 15 分鐘後，即可調配成懸浮溶液。藥品配置後，可放在室溫穩定 6 小時。
LON04	20mg Lonsurf tab	Trifluridine/Tipiracil 20mg	朗斯弗膜衣錠 20 毫克	膜衣錠	膜衣錠應整顆吞服，請勿咀嚼、咬碎。管灌：投入適量的溫水中(22~55°C)，約 15 分鐘後，即可調配成懸浮溶液。藥品配置後，可放在室溫穩定 6 小時。
VEN05	100mg Venclexta tab	Venetoclax tab 100mg	唯可來膜衣錠 100 毫克	膜衣錠	應整顆吞服，不可咀嚼、咬碎或剝開
AV500	(口) 20mg Vinorelbine cap	Vinorelbine soft cap 20mg	溫諾平軟膠囊— 20	軟膠囊	為口服抗癌藥；需以冷開水整顆吞服，不可磨粉、嚼食或剝開。
AV510	(口) 30mg Vinorelbine cap	Vinorelbine soft cap 30mg	溫諾平 30 毫克軟膠	軟膠囊	為口服抗癌藥；需以冷開水整顆吞服，不可磨粉、嚼食或剝開。
TAM03	100mg TamOS cap	Temozolomide cap 100mg	特莫斯膠囊 100 毫克	膠囊	為口服抗癌藥，應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
AT220	100mg TemodaL cap	Temozolomide cap 100mg	帝盟多膠囊	膠囊	為口服抗癌藥，應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
TAM02	20mg TamOS cap	Temozolomide cap 20mg	特莫斯膠囊 20 毫克	膠囊	為口服抗癌藥，應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
AT070	20mg TemodaL cap	Temozolomide cap 20mg	帝盟多膠囊	膠囊	為口服抗癌藥，應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
TEM02	100mg TemaZO cap	Temozolomide cap 20mg	泰莫柔膠囊 100 毫克	膠囊	為口服抗癌藥，應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
TEM01	20mg TemaZO cap	Temozolomide cap 20mg	泰莫柔膠囊 20 毫克	膠囊	為口服抗癌藥，應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
END01	Endoxan tab 50mg	Cyclophosphamide tab 50mg	癌德星錠 50 毫克	糖衣錠	有可能致畸胎，不宜磨粉。
AE130	Endoxan tab-50mg	Cyclophosphamide tab	癌德星錠	糖衣錠	有可能致畸胎，不宜磨粉。

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
		50mg			
AU040	Ufur cap	TEGAFUR 100MG+URACIL 224MG	友復膠囊	膠囊	為口服抗癌藥，應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
TS110	20mg TS-1 cap	TEGAFUR,GIMERACIL, OTERACIL 20MG	愛斯萬膠囊 20 毫克	膠囊	為口服抗癌藥，應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
TS120	25mg TS-1 cap	TEGAFUR,GIMERACIL, OTERACIL 25MG	愛斯萬膠囊 25 毫克	膠囊	為口服抗癌藥，應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
ZYT01	Zytiga tab 250mg	ABIRATERONE ACETATE TAB 250MG	澤珂錠 250 毫克	錠劑	必須整顆以水吞服，請勿壓碎或嚼碎。
ERL01	Erleada film-coated tab 60mg	Apalutamide film-coate tab 60mg	安列康膜衣錠 60 毫克	膜衣錠	錠劑需整顆吞服
XTA01	Xtandi cap 40mg	Enzalutamide cap 40mg	安可坦軟膠囊 40 毫克	軟膠囊	屬危害性藥物，給藥時請小心(如帶手套)。膠囊應以水整粒吞服，勿嚼碎、弄破、打開或融化
VER02	(Free) Verzenio tab 150mg	(Free) Abemaciclib tab 150mg	捷癌寧膜衣錠 150 毫 克-Free	膜衣錠	應整顆吞服，不可將錠劑咀嚼、壓碎或切半後吞服
LOR02	(專案) Lorlatinib tab 25mg	(專案)Lorlatinib tab 25mg		膜衣錠	必須以至少 240mL 的水完整吞服整粒錠劑，不可咀嚼、壓碎或剝半。
VER01	Verzenio tab 150mg	Abemaciclib tab 150mg	捷癌寧膜衣錠 150 毫 克	膜衣錠	應整顆吞服，不可將錠劑咀嚼、壓碎或切半後吞服
GIO01	30mg Afatinib tab	Afatinib dimaleate tab 30mg	妥復克膜衣錠 30 毫克	膜衣錠	藥粒需整顆吞服，無法吞服藥粒的病人，可將藥錠放入 100 毫升飲用水中攪拌溶解後立即使用，再以 100 毫升飲用水潤洗殘留在杯中藥物並服下。以此方式可經由鼻胃管給藥。

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
GIO02	40mg Afatinib tab	Afatinib dimaleate tab 40mg	妥復克膜衣錠 40 毫克	膜衣錠	藥粒需整顆吞服，無法吞服藥粒的病人，可將藥錠放入 100 毫升飲用水中攪拌溶解後立即使用，再以 100 毫升飲用水潤洗殘留在杯中藥物並服下。以此方式可經由鼻胃管給藥。
ALE02	Alecensa cap 150mg	Alectinib cap 150mg	安立適膠囊 150 毫克	膠囊	需整粒吞服，切勿打開膠囊或將膠囊內容物溶化使用
INL10	1mg Inlyta tab	Axitinib tab 1mg	抑癌特膜衣錠 1 毫克	膜衣錠	為口服抗癌藥，不可磨粉、不可剝半使用。應以一杯水整顆吞服。
INL01	5mg Inlyta tab	Axitinib tab 5mg	抑癌特膜衣錠 5 毫克	膜衣錠	為口服抗癌藥，不可磨粉、不可剝半使用。應以一杯水整顆吞服。
ALU06	180mg Alunbrig film-coated tab	Brigatinib film-coated tab 180mg	癌能畢 膜衣錠 180 毫克	膜衣錠	應整粒吞服，勿剝半、磨碎或咀嚼。
ALU05	30mg Alunbrig film-coated tab	Brigatinib film-coated tab 30mg	癌能畢 膜衣錠 30 毫克	膜衣錠	應整粒吞服，勿剝半、磨碎或咀嚼。
BRI05	(專案)30mg Brigatinib tab	Brigatinib tab 30mg		膜衣錠	應整粒吞服，勿剝半、磨碎或咀嚼。
CAB06	20mg Cabometyx tab	Cabozantinib tab 20mg	癌必定膜衣錠 20 毫克	膜衣錠	必須整粒錠劑吞服，不可壓碎、或剝半。 癌必定膜衣錠屬 Hazardous agent，拿取時請戴單層手套。
CAB05	40mg Cabometyx tab	Cabozantinib tab 40mg	癌必定膜衣錠 40 毫克	膜衣錠	必須整粒錠劑吞服，不可壓碎、或剝半。 癌必定膜衣錠屬 Hazardous agent，拿取時請戴單層手套。
CAB04	60mg Cabometyx tab	Cabozantinib tab 60mg	癌必定膜衣錠 60 毫克	膜衣錠	必須整粒錠劑吞服，不可壓碎、或剝半。 癌必定膜衣錠屬 Hazardous agent，拿取時請戴單層手套。
ZYK01	Zykadia cap 150mg	Ceritinib cap 150mg	立克癌膠囊 150 毫克	膠囊	膠囊應整顆配水吞服，不可咬碎或磨粉。
BC730	250mg Crizotinib cap	Crizotinib cap 250mg	截剋瘤膠囊 250 毫克	膠囊	膠囊需整粒吞服，不可磨粉、溶解或打開膠囊。
TAF01	Tafinlar cap 75mg	Dabrafenib cap 75mg	泰伏樂膠囊 75 毫克	膠囊	屬危害性藥物，給藥時請小心(如帶手套)。膠囊應以水整粒吞服，

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
					勿嚼碎、弄破、或打開
BD240	Dasatinib tab 50mg	DASATINIB TAB 50MG	柏萊膜衣錠 50 毫克	膜衣錠	需整粒吞服；有可能致畸胎。
ENT06	(專案)Entrectinib cap 200mg	Entrectinib cap 200mg		膠囊	屬危害性藥物，給藥時請小心(如帶手套)。膠囊應以水整粒吞服，勿嚼碎、弄破、打開或融化
AE530	100mg Tarceva tab	Erlotinib tab 100mg	得舒緩膜衣錠 100 毫克	膜衣錠	為口服抗癌藥；可將藥錠放入 100 ml 的飲用水中，攪拌直到藥錠溶解後立即喝下；或經由鼻胃管管灌。
AE540	150mg Tarceva tab	Erlotinib tab 150mg	得舒緩膜衣錠 150 毫克	膜衣錠	為口服抗癌藥；可將藥錠放入 100 ml 的飲用水中，攪拌直到藥錠溶解後立即喝下；或經由鼻胃管管灌。
TEP01	(專案)Tepmetko tab 250mg	Tepotinib HCl hydrate 250mg		膜衣錠	應整粒吞服，勿剝半、磨碎或咀嚼。
AFI10	Votubia tab 2.5mg	Everolimus tab 2.5 mg	愛服妥錠 2.5 毫克	錠劑	具黏膜刺激性，不宜磨粉。服藥時須整顆藥錠吞服並以整杯水配服，不可咀嚼或咬碎錠劑。避免接觸壓碎的錠劑。若病人無法吞藥，於服藥時可先將藥錠放入裝有 30mL 水的容器中，溫和攪拌後立即服用；再以 30mL 水潤洗容器後服下。
AE650	Afinitor tab 5mg	EVEROLIMUS TAB 5MG	癌伏妥錠 5 毫克	錠劑	具黏膜刺激性，不宜磨粉。服藥時須整顆藥錠吞服並以整杯水配服，不可咀嚼或咬碎錠劑。避免接觸壓碎的錠劑。若病人無法吞藥，於服藥時可先將藥錠放入裝有 30mL 水的容器中，溫和攪拌後立即服用；再以 30mL 水潤洗容器後服下。
AB930	Free-30mg Afatinib tab	Free-30mg Afatinib tab	妥復克膜衣錠 30 毫克	膜衣錠	藥粒需整顆吞服，無法吞服藥粒的病人，可將藥錠放入 100 毫升飲用水中攪拌溶解後立即使用，再以 100 毫升飲用水潤洗殘留在杯中藥物並服下。以此方式可經由鼻胃管給藥。

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
AB920	Free-40mg Afatinib tab	Free-40mg Afatinib tab	妥復克膜衣錠 40 毫克	膜衣錠	藥粒需整顆吞服，無法吞服藥粒的病人，可將藥錠放入 100 毫升飲用水中攪拌溶解後立即使用，再以 100 毫升飲用水潤洗殘留在杯中藥物並服下。以此方式可經由鼻胃管給藥。
CAB01	(Free) 20mg Cabometyx tab	Free-Cabozantinib tab 20mg		錠劑	必須整粒錠劑吞服，不可壓碎、或剝半。 癌必定膜衣錠屬 Hazardous agent，拿取時請戴單層手套。
CAB02	(Free) 40mg Cabometyx tab	Free-Cabozantinib tab 40mg		錠劑	必須整粒錠劑吞服，不可壓碎、或剝半。 癌必定膜衣錠屬 Hazardous agent，拿取時請戴單層手套。
CAB03	(Free) 60mg Cabometyx tab	Free-Cabozantinib tab 60mg		錠劑	必須整粒錠劑吞服，不可壓碎、或剝半。 癌必定膜衣錠屬 Hazardous agent，拿取時請戴單層手套。
TAG01	Free-Osimertinib 80mg 10tab/box	Free-Osimertinib 80mg 10tab/box	Free-泰格莎膜衣錠 80 毫克 10 顆/盒	膜衣錠	1.屬危害性藥物，給藥時請小心（如帶手套、穿防護衣）。 2.錠劑必須整顆吞服，不可以敲碎或磨粉。 3.遇吞嚥困難病人，可將錠劑加入 50mL 白開水，攪拌均勻使崩散後立刻喝下或從 N-G 管灌；再以 120 至 240mL 白開水潤洗杯子後，立即喝下或從 N-G 管灌。
TAG02	Free-Tagrisso tab 80mg	Free-Osimertinib tab 80mg	泰格莎膜衣錠 80 毫克	膜衣錠	Osimertinib 錠劑必須整顆吞服，不可以敲碎或磨粉。遇吞嚥困難病人，可將錠劑加入 50 西西白開水，攪拌均勻使崩散後立刻喝下或從 N-G 管灌；再以 120 至 240 西西白開水潤洗杯子後，立即喝下或從 N-G 管灌。
AG480	Gefitinib tab-250	Gefitinib tab 250mg	艾瑞莎膜衣錠	膜衣錠	為口服抗癌藥；可將「艾瑞莎」藥錠，放入半杯飲用水中，攪拌直到藥錠溶解後，立即喝下，再以半杯水沖洗杯子並喝下。此溶液也可經由鼻胃管管灌。
IMB01	Imbruvica cap 140mg	Ibrutinib cap 140mg	億珂膠囊 140 毫克	膠囊	Ibrutinib 膠囊必須整顆吞服，不可以打開、敲碎或咀嚼。

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
AI130	Glivec tab 100mg	IMATINIB TAB 100MG	基利克膜衣錠	膜衣錠	為口服抗癌藥；無法吞服者可將藥錠放入飲用水或蘋果汁中（100 mg 用 50mL，400 mg 用 200 mL）攪拌直到藥錠崩解呈懸浮液，立即喝下，再以半杯水沖洗杯緣服下。
LEE02	Leevk tab 100mg	Imatinib tab 100mg	利伏抗膜衣錠 100 毫克	膜衣錠	為口服抗癌藥；無法吞服者可將藥錠放入飲用水或蘋果汁中（100 mg 用 50mL，400 mg 用 200 mL）攪拌直到藥錠崩解呈懸浮液，立即喝下，再以半杯水沖洗杯緣服下。
AL450	Lapatinib tab250mg	Lapatinib tab 250mg	泰嘉錠膜衣錠	膜衣錠	應整顆吞服，不可以咀嚼、剝半或磨粉。
LEN02	4mg Lenvima cap	Lenvatinib cap 4mg	樂衛瑪膠囊 4 毫克	膠囊	Lenvima® 膠囊可整粒吞服，或將膠囊先溶解於小杯液體後服用。將膠囊放入一大湯匙的水或蘋果汁中(膠囊不需打開或壓碎)，以溶解於液體。將膠囊靜置於水或蘋果汁中至少 10 分鐘，再攪拌至少 3 分鐘。飲用混合液後，再加入一大湯匙的水或蘋果汁於玻璃杯中，攪勻後再飲用完水或蘋果汁。
LEN05	10mg Lenvima cap	Lenvima cap 10mg	樂衛瑪膠囊 10 毫克	膠囊	Lenvima® 膠囊可整粒吞服，或將膠囊先溶解於小杯液體後服用。將膠囊放入一大湯匙的水或蘋果汁中(膠囊不需打開或壓碎)，以溶解於液體。將膠囊靜置於水或蘋果汁中至少 10 分鐘，再攪拌至少 3 分鐘。飲用混合液後，再加入一大湯匙的水或蘋果汁於玻璃杯中，攪勻後再飲用完水或蘋果汁。
LOR03	Lorviqua tab 25mg	Lorlatinib tab 25mg	瘤利剋膜衣錠 25 毫克	膜衣錠	必須以至少 240mL 的水完整吞服整粒錠劑，不可咀嚼、壓碎或剝半。
LOR05	(專案) Lorbrena tab 25mg	Lorlatinib tab 25mg-Free		膜衣錠	必須完整吞服整粒錠劑，不可咀嚼、壓碎或剝。
RYD01	Rydapt soft cap 25mg	Midostaurin soft cap 25mg	療德妥軟膠囊 25 毫克	軟膠囊	屬危害性藥物，給藥時請小心（如帶手套），必須整顆吞服，不可

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
					以敲碎或磨粉。
AN740	Tasigna cap 150mg	NILOTINIB CAP 150MG	泰息安膠囊 150 毫克	膠囊	整粒吞服，勿將膠囊打開或咬碎。破壞膠囊可能會使血中濃度增加、增加毒性。(ISMP)
AN680	200-Nilotinib cap	NILOTINIB HCL CAP 200 MG	泰息安膠囊 200 毫克	膠囊	整粒吞服，勿將膠囊打開或咬碎。破壞膠囊可能會使血中濃度增加、增加毒性。(ISMP)
TAG03	Tagrisso tab 80mg	Osimertinib tab 80mg	泰格莎 80 毫克	膜衣錠	Osimertinib 錠劑必須整顆吞服，不可以敲碎或磨粉。遇吞嚥困難病人，可將錠劑加入 50 西西白開水，攪拌均勻使崩散後立刻喝下或從 N-G 管灌；再以 120 至 240 西西白開水潤洗杯子後，立即喝下或從 N-G 管灌
IBR02	100mg Ibrance cap	Palbociclib cap 100mg	愛乳適膠囊 100 毫克	膠囊	Palbociclib 膠囊應整顆吞服，請勿咀嚼、咬碎或打開膠囊。如果膠囊破損、有裂痕或殘缺不完整，請不要服用。
IBR01	125mg Ibrance cap	Palbociclib cap 125mg	愛乳適膠囊 125 毫克	膠囊	Palbociclib 膠囊應整顆吞服，請勿咀嚼、咬碎或打開膠囊。如果膠囊破損、有裂痕或殘缺不完整，請不要服用。
BP590	Pazopanib tab200mg	PAZOPANIB TAB 200MG	福退癌膜衣錠	膜衣錠	需整粒空腹服用，不可剝半或磨粉。請勿壓碎藥錠，因為可能會增加吸收速率而影響全身暴露量。
ICL01	Iclusig tab 15mg	Ponatinib tab 15mg	英可欣膜衣錠 15 毫克	膜衣錠	可與食物一起服用或單獨服用，應整錠吞服。不可壓碎或溶解錠劑
JAK03	15mg Jakavi tab	Ruxolitinib tab 15mg	捷可衛錠 15 毫克	錠劑	1.Jakavi 必須整顆吞服，不可切開、敲碎或咀嚼。 2.從 NG tube 管灌時，一顆加入 40mL 水中，攪拌 10 分鐘後給藥，再以 75mL 水沖洗 NG tube；Jakavi 崩散於水後應在 6 小時內服用完畢。
JAK02	5mg Jakavi tab	Ruxolitinib tab 5mg	捷可衛錠 5 毫克	錠劑	1.Jakavi 必須整顆吞服，不可切開、敲碎或咀嚼。 2.從 NG tube 管灌時，一顆加入 40mL 水中，攪拌 10 分鐘後給藥，

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
					再以 75mL 水沖洗 NG tube；Jakavi 崩散於水後應在 6 小時內服用完畢。
JAK01	Free-Jakavi tab 5mg	RUXOLITINIB TAB 5MG-FREE	捷可衛錠 5 毫克	錠劑	1. Jakavi 必須整顆吞服，不可切開、敲碎或咀嚼。 2. 從 NG tube 管灌時，一顆加入 40mL 水中，攪拌 10 分鐘後給藥，再以 75mL 水沖洗 NG tube；Jakavi 崩散於水後應在 6 小時內服用完畢。
AS670	NexAVAR tab 200mg	Sorafenib tab 200mg	蕾莎瓦膜衣錠	膜衣錠	應整顆吞服，鼻胃管病人使用，不可直接磨粉，請將整顆錠劑放入冷白開水中攪拌崩解後立刻服用，再以半杯水沖洗杯緣服下
MEK01	Mekinist tab 2mg	Trametinib tab 2mg	麥欣覓膜衣錠 2 毫克	膜衣錠	為口服抗癌藥，應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
ZEL01	Zelboraf tab 240mg	Vemurafenib tab 240mg	日沛樂膜衣錠 240 毫克	膜衣錠	ZELBORAF 錠劑應搭配 1 杯開水整顆吞服，不應咀嚼或咬碎。
NIN01	Free-2.3mg Ixazomib cap	Free-Ixazomib cap 2.3mg		膠囊	整顆膠囊以水送服，不可壓碎、咀嚼或打開膠囊。
NIN02	Free-3mg Ixazomib cap	Free-Ixazomib cap 3mg		膠囊	整顆膠囊以水送服，不可壓碎、咀嚼或打開膠囊。
AH250	Hydrea cap 500mg	Hydroxyurea cap 500mg	愛治膠囊	膠囊	接觸到粉末可能引起嚴重的皮膚毒性，醫療人員給此藥時應帶手套。
NIN03	Ninlaro cap 4mg	Ixazomib cap 4mg	免瘤諾膠囊 4 毫克	膠囊	具黏膜刺激性及致畸胎性，不宜磨粉或咀嚼。
REV01	10mg Revlimid cap	Lenalidomide cap 10mg	瑞復美膠囊 10 毫克	膠囊	有致畸胎性，必須整顆吞服，不可以咬破、嚼碎或打開膠囊。
REV10	25mg Revlimid cap	Lenalidomide cap 25mg	25 毫克瑞復美膠囊	膠囊	有致畸胎性，必須整顆吞服，不可以咬破、嚼碎或打開膠囊。
BM340	Mitotane tab 500mg	MITOTANE TAB 500MG		錠劑	為化療藥品，不可以壓碎或磨粉，拿取時應做好防護措施(例如帶

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
					手套)
LYN01	Free-Lynparza cap 50mg	Olaparib cap 50mg-Free		膠囊	必須完整吞服整粒錠劑，不可咀嚼、壓碎、溶解或剝半。
LYN02	Lynparza tab 150mg	Olaparib tab 150mg	令癌莎膜衣錠 150 毫克	膠囊	必須完整吞服整粒錠劑，不可咀嚼、壓碎、溶解或剝半。
POM01	2mg Pomalyst cap	Pomalidomide cap	鉑美特膠囊 2 毫克	膠囊	Pomalyst 膠囊必須整粒吞服，請勿壓碎、咀嚼或打開膠囊
POM02	4mg Pomalyst cap	Pomalidomide cap 4mg	鉑美特膠囊 4 毫克	膠囊	Pomalyst 膠囊必須整粒吞服，請勿壓碎、咀嚼或打開膠囊
AT910	Tretinoin cap 10mg	TRETINOIN CAP 10MG	凡善能軟膠囊	軟膠囊	應整粒吞服，不可以打開或咀嚼，因其成分對黏膜有刺激性。
AR310	Rivastigmine 1.5mg	RIVASTIGMINE CAP 1.5MG	憶思能膠囊	膠囊	需整顆吞服。若無法整粒吞服時，可以少量水或果汁混合後，馬上喝下。
AR380	Exelon cap 4.5mg	RIVASTIGMINE HYDROGEN TART.4.5MG	憶思能膠囊	膠囊	需整顆吞服。若無法整粒吞服時，可以少量水或果汁混合後，馬上喝下。
EXE01	6mg Exelon cap	RIVASTIGMINE HYDROGEN TART.6MG	憶思能膠囊 6 毫克	膠囊	需整顆吞服。若無法整粒吞服時，可以少量水或果汁混合後，馬上喝下。
AR370	3mg Rivastigmine	RIVASTIGMINE HYDROGEN TARTR.3MG	憶思能膠囊	膠囊	需整顆吞服。若無法整粒吞服時，可以少量水或果汁混合後，馬上喝下。
DIC03	100mg Dicetel tab	100mg Pinaverium tab	得舒特膜衣錠 100 毫克	膜衣錠	整粒吞服，請勿口含或咀嚼。請於用餐時以一大杯開水吞服以避免食道粘膜接觸。躺臥時或就寢前請勿服用。
DIC02	50mg Dicetel tab	50mg Pinaverium tab	得舒特膜衣錠 50 毫克	膜衣錠	整粒吞服，請勿口含或咀嚼。請於用餐時以一大杯開水吞服以避免食道粘膜接觸。躺臥時或就寢前請勿服用。

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
AP430	Delibs tab 50mg	Pinaverium bromide tab 50mg	免腸躁膜衣錠	膜衣錠	整粒吞服，請勿口含或咀嚼。請於用餐時以一大杯開水吞服以避免食道粘膜接觸。躺臥時或就寢前請勿服用。
TAM05	Tamso SR cap 0.2mg	Tamsulosin HCl SR cap 0.2mg	替你坦舒持續釋放膠囊 0.2 毫克	持續釋放膠囊	不宜磨粉，劑型為持續釋放膠囊，破壞劑型可能會影響其藥動學。
BT300	Harnalidge D tab	TAMSULOSIN HCL TAB 0.2MG	活路利淨 D 口溶錠	口溶錠	將本藥置於舌頭上(勿咀嚼)，待完全溶解後再配適量溫開水吞服；不可磨粉。
HAR01	OCAS Harnalidge 0.4 mg	TAMSULOSIN OCAS PR TAB 0.4 MG	活路利淨持續性錠 0.4 毫克	持續釋放錠	為持續性藥效膜衣錠，必須整粒吞服不可磨碎或咀嚼。
TAM06	Tamokas PR tab 0.4mg	Tamsulosin PR tab 0.4mg	益利舒持續性藥效膜 衣錠 0.4 毫克	持續性藥效膜 衣錠	為持續性藥效膜衣錠，必須整粒吞服不可磨碎或咀嚼
AF740	Ferrous Gluco-B	Ferro.Gluconate 0.3g+Vit.B1+VitC	維他葡萄糖鐵糖衣片	糖衣錠	此為鐵劑，不宜磨粉。
FER01	Ferrin cap 150/1/0.025mg	Iron/Folic/B12,150/1/0.025 mg	鐵達血膠囊	膠囊	複方劑型，需整粒吞服
PRA10	110mg Pradaxa cap	DABIGATRAN ETEXILATE CAP 110MG	普栓達膠囊 110 毫克	膠囊	膠囊必需整顆吞服，不可咀嚼、撥開或壓碎；因可能導致藥物暴露量增加，使得出血風險增加。
PRA20	150mg Pradaxa cap	DABIGATRAN ETEXILATE CAP 150MG	普栓達膠囊 150 毫克	膠囊	膠囊必需整顆吞服，不可咀嚼、撥開或壓碎；因可能導致藥物暴露量增加，使得出血風險增加。
PRA03	75mg Pradaxa cap	DABIGATRAN ETEXILATE CAP 75MG	普栓達膠囊 75 毫克	膠囊	膠囊必需整顆吞服，不可咀嚼、撥開或壓碎；因可能導致藥物暴露量增加，使得出血風險增加。

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
BA440	Aggrenox cap 225mg	DIPYRIDAMOLE-200+A SP-25	腦康平持續膠囊	持續性藥效膠囊	1.膠囊整顆吞服，可打開膠囊，但不可咬碎或磨碎顆粒。2.Aggrenox膠囊內含白色 Aspirin 錠劑一粒及黃色 Dipyridamole 緩釋小微粒，遇管灌病人時，可將白色錠劑磨粉溶於 10ml 水中管灌，其他黃色微粒同樣以 10ml 水配成懸浮液管灌，之後再立即以 20ml 水沖管路確保所有藥物皆進入胃中。
FYL01	Fylin tab 400mg	PENTOXIFYLLINE TAB 400MG	暢循持續性膜衣錠	持續釋放錠	應整粒吞服，不可磨粉。
BC680	IpentoL tab 400mg	PENTOXIFYLLINE TAB 400MG	怡腦坦持續性錠	持續釋放錠	應整粒吞服，不可磨粉。
AP440	Propafenone tab 150mg	Propafenone tab 150mg	心利正膜衣錠	膜衣錠	具苦味和表面麻醉的作用，應整粒吞服，不宜磨粉或咀嚼。
RHY01	Rhynorm tab 150mg	Propafenone tab 150mg	律諾膜衣錠 150 毫克	膜衣錠	具苦味和表面麻醉的作用，應整粒吞服，不宜磨粉或咀嚼。
TRI01	Trilipix MR cap 135mg	Choline fenofibrate MR 135mg	利落脂寧緩釋膠囊 135 毫克	緩釋膠囊	緩釋微粒膠囊，須整粒吞服，不打開膠囊、嚼碎、弄破或搗碎
FEN01	Fenolip-U tab 160mg	Fenofibrate-U tab 160mg	祛脂優錠 160 毫克	錠劑	微粒化劑型；與食物併服，須整粒吞服，勿嚼碎、弄破或搗碎。
ATO03	Atozet tab 10/20mg	Ezetimibe/atorvastatin tab 10/20	優泰脂膜衣錠 10/20 毫 克	膜衣錠	需整粒吞服，不可研碎、溶解或咀嚼使用
LIN02	Linicor tab 500/20m	Niacin,Lovastatin tab 500/20mg	理脂膜衣錠 500/20 毫 克	膜衣錠	緩釋劑型，需整粒吞服，不可咬碎剝半或磨粉
AS680	40mg Zocor tab	SIMVASTATIN TAB 40MG	素果 40 公絲膜衣錠	膜衣錠	不宜研磨。經由鼻胃管給藥時，將藥錠以約 10 ml 的水，輕搖使藥錠崩散後給藥。

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
AI680	60mg CR Imdur tab	ISOSORBIDE 5-MONONITRATE 60MG	寬心持續性藥效錠	持續釋放錠	可剝半，不宜磨粉，磨粉後破壞控制釋放的設計。
ISO03	IsormoL tab 20mg	Isosorbide 5-Mononitrate tab20mg	愛速脈錠	錠劑	仿單：不可咬碎
AN360	Nitrostat tab 25's	Nitroglycerin tab 25'S	耐絞寧錠	舌下含錠	不可磨粉或直接吞服，只適於舌下使用。
BA810	Alfuzosin XL tab 10mg	ALFUZOSIN TAB 10MG	扎特持續性藥效錠	持續性藥效錠	Alfuzosin XL 10mg 必須整粒吞服，不可剝半、咀嚼或磨粉；因它是以 Geomatrix 技術製成的持續性藥效錠。
BD050	4mg Doxaben XL tab	DOXAZOSIN XL TAB 4MG	可迅持續藥效錠	持續釋放錠	需整粒吞服，不可咬碎，分割或磨碎。
ATA01	5mg Nifedipine cap	NIFEDIPINE CAP 5MG	壓達能軟膠囊 5 公絲	軟膠囊	內為油狀物，不宜磨粉，可咬破後吞服。
AN230	OROS Adalat-30 tab	Nifedipine OROS 30 tab	冠達悅歐樂持續錠	持續釋放錠	持續釋放錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
AN280	Nimotop tab 30mg	NIMODIPINE TAB 30MG	腦妥膜衣錠	膜衣錠	有特殊味道，需整粒吞服，不宜磨粉。
TWY10	Twynsta tab 80/5mg	Telmisartan/Amlodipine 80/5mg	倍必康平錠 80/5 毫克	錠劑	錠劑具吸濕性，從鋁箔片取出後，應整顆立即吞服，磨粉後易潮解，且需避免潮濕與光照
AD450	Diltiazem tab 90mg	Diltiazem retard tab 90mg	凱帝心徐放錠	持續釋放錠	應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
AD860	180mg Diltiazem tab	Diltiazem unotard PR tab 180mg	凱帝心徐放錠	持續釋放錠	應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
ISO05	Isoptin SR tab 240mg	Verapamil SR tab 240mg	心舒平持續性膜衣錠	持續性膜衣錠	應整粒吞服，不可敲碎或嚼碎
AL640	Cozaar tab 50mg	LOSARTAN TAB 50MG	可悅您膜衣錠	膜衣錠	宜整粒吞服，可剝半
AH600	Hyzaar 100/12.5 mg	Losartan/dithiazide	好悅您	膜衣錠	複方劑型，宜整粒吞服

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
		100/12.5mg			
HYS01	Hysartan 50/12.5mg	Losartan/Dithiazide 50/12.5mg	壓寧悅膜衣錠 50/12.5 毫克	膜衣錠	複方劑型，宜整粒吞服
PIN02	Pinton SR tab 400mg	Etodolac SR tab 400mg	平痛持續性藥效錠 400 毫克	持續性藥效錠	持續性藥效錠，需整顆吞服，不要咀嚼或壓碎
AB630	Bokey cap 100mg	ACETYL SALICYLIC ACID CAP 100MG	伯基腸溶微粒膠囊	腸溶微粒膠囊	整粒吞服或打開膠囊但不可咬碎或磨碎顆粒。
BA330	Ascotyl EM-100 cap	ASPIRIN EM CAP 100MG	暢血脈腸溶微粒膠囊	腸溶微粒膠囊	整粒吞服或打開膠囊但不可咬碎或磨碎顆粒。
ACE02	ACEO retard cap 90mg	AceMEtacin retard cap 90mg	痛立安長效膠囊 90 公 絲	長效膠囊	長效膠囊，需整粒以水吞服，不可咬破
AV440	EM Voren cap 50mg	DICLOFENAC EM CAP 50MG	非炎腸溶微粒膠囊	腸溶微粒膠囊	腸溶微粒膠囊，可打開膠囊，但不可嚼碎顆粒，避免對胃部產生 刺激性。
KEP10	Ketoprofen SR 200mg	KETOPROFEN SR CAP 200MG	可平痛緩釋膠囊 200 毫克	緩釋膠囊	Ketoprofen SR capsules 為緩釋膠囊，須整粒吞服，膠囊內的小顆粒 不可以磨粉。
FEN03	Fentora buccaL tab 100mcg	Fentanyl buccaL tab 100mcg	吩妥拉口頰錠 100 微 公克	口頰錠	不可將口頰錠切割、粉碎、吸入、咀嚼或整顆吞服，因這會導致血 漿濃度比依照指示使用時為低。
JUR01	Jurnista PR tab 8mg	HYDROMORPHONE PR TAB 8MG	釋通緩釋錠 8 毫克	緩釋錠	需整粒吞服，不可剝半、不可咬碎
FM040	30mg Morphine tab	MORPHINE CONT. TAB 30MG	嗎啡長效膜衣錠	持續釋放錠	磨粉後破壞控制釋放的設計。

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
FM100	XL Morphine-60 cap	MORPHINE SULFATE CAP 60MG	默痛舒持續性膠囊	持續釋放膠囊	1.默痛舒膠囊用法為每 24 小時服用一次，應整粒膠囊吞服，請勿壓碎或嚼碎膠囊及其小顆粒。 2.對於使用管灌餵食病人，可以打開膠囊，將內含的小顆粒撒於流質或不含酒精的冷飲料中給與管灌；但絕對不可以加入白開水或生理食鹽水中，以免凝結成塊。
OXY02	10mg OxyContin CR tab	Oxycodone CR tab 10mg	疼始康定 10 毫克持續 藥效錠	持續釋放錠	持續藥效錠，應整粒吞服，並配以足量的開水，不可切開、剝開、咀嚼、敲碎或溶解
OXY03	20mg OxyContin CR tab	Oxycodone CR tab 20mg	疼始康定 20 毫克持續 藥效錠	持續釋放錠	持續藥效錠，應整粒吞服，並配以足量的開水，不可切開、剝開、咀嚼、敲碎或溶解
OXY01	OxyNorm IR cap 5mg	Oxycodone IR cap 5mg	奧諾美 5 毫克速效膠 囊	膠囊	1. 需整粒吞服，若切開、剝開、咀嚼、敲碎或溶解後，將導致藥物迅速釋出，進而提高用藥過量與死亡的風險。 2. 遇無法將整粒膠囊吞下者，可將膠囊內容物撒在柔軟食物上（如冰淇淋，布丁，優格）後立即吞下，再喝水潤口確保所有藥物皆服下。 3. 遇 N-G feeding 或 gastrostomy 者先以水加入管路，打開膠囊將內容物直接倒入管路，接著用 15mL 水沖洗管路，再以 10mL 水多沖洗 2 次以上。也可以用牛奶或液態營養補充物取代水。 (micromedex)
AT420	100mg Tramadol SR tab	Tramadol SR tab 100mg	妙而通持續釋放錠	持續釋放錠	磨粉後破壞控制釋放的設計。
WON01	Wontran ER tab 75/650mg	Tramadol/Scanol ER tab 75/650mg	保寧緩釋錠	緩釋錠	緩釋劑型，需整粒吞服，不可咬碎剝半或磨粉

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
AT130	Tegretol CR-200mg	CARBAMAZEPINE CR TAB 200MG	癲通長效膜衣錠	長效膜衣錠	磨粉後破壞控制釋放的設計，造成血中濃度不穩定，但可剝半。
UFR01	UFree ER tab 500mg	Levetiracetam ER tab 500mg	優活持續釋放膜衣錠 500 毫克	持續釋放膜衣 錠	持續釋放膜衣錠，磨粉後破壞控制釋放的設計，不可剝半或磨粉。
AL140	Kepra tab 500mg	Levetiracetam tab 500mg	優閒膜衣錠	膜衣錠	有特殊苦味，不宜磨粉。
NOB01	Nobelin XR tab 750mg	LEVETIRACETAM XR TAB 750MG	意必寧持續錠 750 毫 克	持續錠	持續釋放膜衣錠，磨粉後破壞控制釋放的設計，不可剝半或磨粉。
FYC01	Fycompa tab 2mg	Perampanel tab 2mg	癲控達膜衣錠 2 毫克	膜衣錠	本品搭配水吞服。不可咀嚼、壓碎或剝半服用。本品無剝半線，無法準確剝半。為確保患者服用完整劑量，應整錠吞服，不可咀嚼或壓碎。
AD030	500mg Chrono Depakine tab	SOD. VALPROATE TAB 500mg	帝拔癲持續膜衣錠	長效劑型	磨粉後破壞控制釋放的設計，造成血中濃度不穩定；可剝半服用。
BT210	Cap Topamax-25mg	Topiramate sprinkle cap 25mg	妥泰分散型膠囊	持續釋放膠囊	1. Topiramate 有錠劑及分散型膠囊兩種劑型，建議不要將錠劑剝開。不能吞服錠劑的病人，如兒童及老年人，可服用分散型膠囊。 2. Topiramate 分散型膠囊可整顆吞服，亦可將膠囊小心剝開再將所有的膠囊內容物灑佈於少量(茶匙)的軟質食物。立刻吞服此藥物 / 食物混合物毋須咀嚼，不要保存此混合物備用。
TOP03	(十全)Topaless F.C. tab 100mg	Topiramate tab 100mg	癲除膜衣錠 100 毫克	膜衣錠	1. Topiramate 有錠劑及分散型膠囊兩種劑型，建議不要將錠劑剝開。不能吞服錠劑的病人，如兒童及老年人，可服用分散型膠囊。 2. Topiramate 分散型膠囊可整顆吞服，亦可將膠囊小心剝開再將所有的膠囊內容物灑佈於少量(茶匙)的軟質食物。立刻吞服此藥物 / 食物混合物毋須咀嚼，不要保存此混合物備用。

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
TRO04	Trokendi XR cap 200mg	TOPIRAMATE XR cap 200MG	妥偏停持續性釋放膠囊 200 毫克	持續釋放膠囊	1. Topiramate 有錠劑及分散型膠囊兩種劑型，建議不要將錠劑剝開。不能吞服錠劑的病人，如兒童及老年人，可服用分散型膠囊。 2. Topiramate 分散型膠囊可整顆吞服，亦可將膠囊小心剝開再將所有的膠囊內容物灑佈於少量(茶匙)的軟質食物。立刻吞服此藥物 / 食物混合物毋須咀嚼，不要保存此混合物備用。
AD120	200mg Depakine tab	Valproate Sod. tab 200mg	帝拔癲腸溶錠	腸溶錠	藥品易吸潮，且對粘膜有刺激性；腸溶錠宜整粒吞服，不可剝半服用。
DEP04	200mg Depakine tab	Valproate Sod. tab 200mg	帝拔癲腸溶錠	腸溶錠	藥品易吸潮，且對粘膜有刺激性；腸溶錠宜整粒吞服，不可剝半服用。
BD250	Cymbalta cap 30mg	Duloxetine cap 30mg	千憂解	腸溶微粒膠囊	內含腸溶緩釋型小顆粒，應整粒吞服。不可咀嚼或壓碎。勿打開膠囊及將膠囊內容物與食物或液體混和服用。
EFE01	Efexor-XR cap 75mg	Venlafaxine-XR cap 75mg	速悅持續性藥效膠囊 75 毫克	持續性藥效膠囊	持續性藥效膠囊，必須配開水整顆吞服；切勿咀嚼、壓碎、剝半或放入水中使用。可將膠囊小心打開，將內容物倒在湯匙內與開水一起立即吞服。
BUP10	BuproTRIN SR 150mg PSY	BUPROPION SR TAB 150MG PSY	慮舒妥 150 毫克	持續釋放錠	持續釋放錠，應整粒吞服，不可壓碎或嚼碎。
AZ130	BuproTRIN SR 150mg QUIT	BUPROPION SR TAB 150MG QUIT	慮舒妥 150 毫克	持續釋放錠	持續釋放錠，應整粒吞服，不可壓碎或嚼碎。
AB850	XL Wellbutrin-150	BUPROPION XL TAB 150 MG	威克倦持續性藥效錠	持續釋放錠	Wellbutrin XL 為持續釋放錠，應整粒吞服，不可壓碎或嚼碎。
MIR01	Mirtapine OD tab 30mg	MIRTAZAPINE OD TAB 30MG	美妥平口溶錠 30 毫克	口溶錠	口溶錠應置於口中，它會迅速分散於唾液中、故容易吞服。

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
OZA01	Ozapex OD tab 5mg	Olanzapine OD tab 5mg	悠悅平口溶錠 5 毫克	口溶錠	<ol style="list-style-type: none"> 1. 口溶錠應置於口中，它會迅速分散於唾液中、故容易吞服。要完整地將整顆口溶錠從口中取出是困難的。 2. 可置於口中或將它分散在水或合適的飲料(柳丁汁、蘋果汁、牛奶或咖啡)中服用。 3. 因為口溶錠易碎，所以由包裝取出後應立刻服用。
ZYP01	Zyprexa Zydis tab 5mg	Olanzapine Zydis tab 5mg	津普速口溶錠 5 公絲	口溶錠	<ol style="list-style-type: none"> 1. 口溶錠應置於口中，它會迅速分散於唾液中、故容易吞服。要完整地將整顆口溶錠從口中取出是困難的。 2. 可置於口中或將它分散在水或合適的飲料(柳丁汁、蘋果汁、牛奶或咖啡)中服用。 3. 因為口溶錠易碎，所以由包裝取出後應立刻服用。
BP290	Paliperidone tab-3	PALIPERIDONE TAB 3MG	思維佳持續錠 3 毫克	持續釋放錠	需整粒吞服；不可咬碎、分割或磨碎藥錠。 是一種 OROS 滲透壓控制釋出的口服劑型
INV01	9mg Invega tab	PALIPERIDONE TAB 9MG	思維佳持續錠 9 毫克	持續釋放錠	需整粒吞服；不可咬碎、分割或磨碎藥錠。 是一種 OROS 滲透壓控制釋出的口服劑型
AQ080	50mg Seroquel XR	QUETIAPINE FUMARATE XR 50 MG	思樂康持續性藥效錠	持續釋放錠	思樂康持續性藥效錠必須整粒吞服，不可以剝半、咀嚼、或壓碎。
MEG01	Megazon PR tab 50mg	Quetiapine PR tab 50 MG	美加柔持續藥效膜衣錠 50 毫克	持續釋放錠	必須整粒吞服，不可以剝半、咀嚼、或壓碎。
AQ060	200mg Seroquel XR	QUETIAPINE XR TAB 200MG	思樂康持續性藥效錠	持續釋放錠	必須整粒吞服，不可以剝半、咀嚼、或壓碎。
GEO01	Geodon cap 40mg	Ziprasidone cap 40mg	哲思膠囊 40 毫克	膠囊	應整顆吞服，不建議打開膠囊服用，若要打開必須戴雙層手套及戴口罩，以避免直接接觸。

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
BM020	18mg Concerta ER tab	Methylphenidate ER tab 18mg	專思達長效錠 18 毫克	持續釋放錠	應整粒吞服，不可剝半或嚼碎
CON02	27mg Concerta ER tab	Methylphenidate ER tab 27mg	專思達長效錠 27 毫克	持續釋放錠	應整粒吞服，不可剝半或嚼碎
BM030	36mg Concerta ER tab	Methylphenidate ER tab 36mg	專思達長效錠 36 毫克	持續釋放錠	應整粒吞服，不可剝半或嚼碎
RIT01	20mg Ritalin LA cap	Methylphenidate LA cap 20mg	利長能持續性藥效膠 囊 20 毫克	持續性藥效膠 囊	Ritalin LA 持續性藥效膠囊須整粒吞服，膠囊內的藥粒不可磨碎、咀嚼或切割藥粒。可將膠囊內的藥粒撒在少量的食物上服用；將藥粒撒在蘋果泥，蘋果泥不可加熱，因為溫度會破壞藥品緩慢釋出的特性。藥粒和蘋果泥混合後，應立刻全部吃完，不可將這混合物儲存以備將來服用。
ROZ01	Rozerem tab 8 mg	RAMELTEON TAB 8 MG	柔速瑞膜衣錠 8 毫克	膜衣錠	仿單建議，務必整粒吞服。
AZ170	CR Stilnox tab6.25	ZOLPIDEM TARTRATE TAB 6.25MG	使蒂諾斯長效錠	膜衣錠	為一種兩層的加衣長效錠，其中一層會快速釋出藥物成分，另一層則會緩慢釋出藥物成分。不宜磨粉，需整粒吞服，不可折半、壓碎或咀嚼。
LES01	Lesiton cap 5mg	Dihydroergotamine cap 5mg	樂息痛膠囊 5 毫克	持續釋放膠囊	持續釋放膠囊，需整粒吞服，磨粉後破壞控制釋放的設計，不可剝半或磨粉。
DS080	Seglor Retard cap	Dihydroergotamine retard cap 5mg	塞戈羅膠囊	持續釋放膠囊	不可咬碎，需整粒吞服。
MIR02	0.375mg Mirapex PR tab	Pramipexole PR tab 0.375mg	樂伯克持續性藥效錠 0.375 毫克	持續釋放錠	樂伯克持續性藥效錠必須整顆吞服，不可嚼碎、壓碎或切割。
MIR10	1.5mg Mirapex PR tab	Pramipexole PR tab 1.5mg	樂伯克持續錠 1.5 毫克	持續釋放錠	樂伯克持續性藥效錠必須整顆吞服，不可嚼碎、壓碎或切割。

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
AR610	ReQuip PD tab 4mg	ROPINIROLE PD TAB 4MG	力必平持續性膜衣錠	持續藥效膜衣 錠	為持續性藥效膜衣錠，必須整顆吞服；切勿咀嚼、壓碎或剝半使用
REQ30	8mg ReQuip PD tab	ROPINIROLE PD TAB 8MG	力必平持續錠 8 毫克	持續藥效膜衣 錠	為持續性藥效膜衣錠，必須整顆吞服；切勿咀嚼、壓碎或剝半使用。
ACA01	Acamprosate calcium tab 333mg	Acamprosate calcium tab 333mg	阿坎酸鈣 333 毫克緩 釋錠	緩釋錠	緩釋錠，須整顆以水吞服，請勿壓碎或嚼碎。
STR01	Free-Strattera cap 10mg	ATOMOXETINE CAP 10MG FREE	思銳膠囊 10 毫克	膠囊	Strattera 必須整顆吞服，不可以打開膠囊，因它是一種眼睛刺激物。
BA710	Strattera cap 25mg	ATOMOXETINE CAP 25MG	思銳膠囊 25 毫克	膠囊	藥品具有刺激性，建議整粒吞服。
BA720	40mg Strattera cap	ATOMOXETINE CAP 40MG	思銳膠囊 40 毫克	膠囊	藥品具有刺激性，建議整粒吞服。
AM010	HBS Madopar-125mg	L-DOPA 100MG+ BENSERAZIDE 25MG	美道普持續藥效膠囊	持續釋放膠囊	應整粒吞服，打開膠囊給藥會破壞控制釋放的設計。Madopar HBS 進入胃內，外部膠囊殼破裂後，與 Madopar 藥物相混合的賦型劑之一 hydrocolloid 會將 Madopar 包覆形成一膠狀物，慢慢使之釋放出來；以維持穩定之血中濃度。
BS060	100/25/200 Stalevo	LEVODOPA/CARBIDOP A/ENTACAPONE	始立膜衣錠	複方膜衣錠	Swallow tablet whole; do not crush, break, or chew 複方製劑，不宜磨粉。
SIN02	25/100 Sinemet tab	Carbidopa/ Levodopa tab 25/100	心寧美 25/100 錠	膜衣錠	需整粒吞服，不可剝半或磨粉
NEP01	NephoxiL cap 500mg	Ferric citrate cap 500mg	拿百磷膠囊 500 毫克	膠囊	需整粒吞服，不應剝開或磨碎。

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
REN02	Tab Renvela 0.8g	Sevelamer carbonate tab 0.8g	磷減樂錠	膜衣錠	Renvela 錠劑應整顆吞服，不可磨碎、咀嚼或剝開藥品。
BRO01	Broen-C tab	BROMELAIN,L-CYSTEI NE ENTERIC TAB	撲炎喜腸溶膜衣錠	腸溶膜衣錠	Broen-C 為腸溶膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半、嚼碎、磨粉服用。
OFE01	Ofev cap 150mg	Nintedanib ethanesulfonate 150mg	抑肺纖軟膠囊 150 毫 克	軟膠囊	搭配液體飯後整顆吞服，味道很苦勿咬碎或咀嚼。
AB200	Bensau cap 100mg	BENZONATATE CAP 100MG	剝咳得軟膠囊	軟膠囊	若咬碎膠囊，會使口腔粘膜局部麻醉而有梗塞感。
ZCO01	Zcough cap 100mg	Benzonatate soft cap 100mg	咳治得軟膠囊 100 毫 克	軟膠囊	若咬碎膠囊，會使口腔粘膜局部麻醉而有梗塞感。
AMB01	Ambro SR tab 75mg	AMBROXOL SR TAB 75MG	談舒持續性藥效錠	持續性藥效錠	Ambro SR 為持續性藥效錠，服用時以充分的開水整粒吞服，不可咀嚼。
VOL01	10mg Volibris tab	AMBrisentan tab 10mg	肺博舒 10 毫克	膜衣錠	Ambrisentan 錠劑不可剝開、研碎或嚼碎
BA860	5mg Volibris tab	AMBrisentan tab 5mg	肺博舒 5 毫克	膜衣錠	Ambrisentan 錠劑不可剝開、研碎或嚼碎
BB140	125mg Bosentan tab-1st	Bosentan tab 125mg-1st	全可利 125 毫克	錠劑	需整粒吞服。若無法吞服，於給藥前立即將其分散在最少量的水中立即服用。有可能致畸胎，懷孕婦女或可能懷孕婦女不可以接觸到壓碎或破碎的 Bosentan 錠劑。
TRA05	125mg Bosentan tab-2nd	Bosentan tab 125mg-2nd	愛可泰隆全可利 125 毫克	錠劑	需整粒吞服。若無法吞服，於給藥前立即將其分散在最少量的水中立即服用。有可能致畸胎，懷孕婦女或可能懷孕婦女不可以接觸到壓碎或破碎的 Bosentan 錠劑。
BB130	62.5mg Bosentan tab-1st	Bosentan tab 62.5mg-1st	全可利 62.5 毫克	錠劑	需整粒吞服。若無法吞服，於給藥前立即將其分散在最少量的水中立即服用。有可能致畸胎，懷孕婦女或可能懷孕婦女不可以接觸到壓碎或破碎的 Bosentan 錠劑。

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
TRA04	62.5mg Bosentan tab-2nd	Bosentan tab 62.5mg-2nd	愛可泰隆全可利 62.5 毫克	錠劑	需整粒吞服。若無法吞服，於給藥前立即將其分散在最少量的水中立即服用。有可能致畸胎，懷孕婦女或可能懷孕婦女不可以接觸到壓碎或破碎的 Bosentan 錠劑。
ADE01	Free-0.5mg Riociguat tab	Free-Riociguat tab 0.5mg	愛定保肺膜衣錠 0.5 毫 克	膜衣錠	不可剝開、研碎或嚼碎
ADE02	Free-1mg Riociguat tab	Free-Riociguat tab 1mg	愛定保肺膜衣錠 1 毫 克	膜衣錠	不可剝開、研碎或嚼碎
ADE05	Free-2.5mg Riociguat tab	Free-Riociguat tab 2.5mg	愛定保肺膜衣錠 2.5 毫 克	膜衣錠	不可剝開、研碎或嚼碎
ADE04	Free-2mg Riociguat tab	Free-Riociguat tab 2mg	愛定保肺膜衣錠 2 毫 克	膜衣錠	不可剝開、研碎或嚼碎
OPS02	(CM)Opsumit tab 10 mg	Macitentan tab 10mg	奧欣明膜衣錠 10 毫克	膜衣錠	膜衣錠應以開水整錠吞服；不可以剝半、弄碎或嚼碎。
OPS01	Macitentan tab 10mg	Macitentan tab 10mg	傲朴舒膜衣錠 10 毫克	膜衣錠	膜衣錠應以開水整錠吞服；不可以剝半、弄碎或嚼碎。
ADE03	Free-1.5mg Riociguat tab	Riociguat tab 1.5mg	愛定保肺膜衣錠 1.5 毫 克	膜衣錠	建議整粒吞服，對於無法整顆吞服的病患，可以在服用前壓碎錠劑且立即與水或軟食物，例如蘋果醬混合，口服服用
ADE06	1mg Adempas tab	Riociguat tab 1mg	愛定保肺膜衣錠 1 毫 克	膜衣錠	建議整粒吞服，對於無法整顆吞服的病患，可以在服用前壓碎錠劑且立即與水或軟食物，例如蘋果醬混合，口服服用
ADE08	2.5mg Adempas tab	Riociguat tab 2.5mg	愛定保肺膜衣錠 2.5 毫 克	膜衣錠	建議整粒吞服，對於無法整顆吞服的病患，可以在服用前壓碎錠劑且立即與水或軟食物，例如蘋果醬混合，口服服用
ADE07	2mg Adempas tab	Riociguat tab 2mg	愛定保肺膜衣錠 2 毫 克	膜衣錠	建議整粒吞服，對於無法整顆吞服的病患，可以在服用前壓碎錠劑且立即與水或軟食物，例如蘋果醬混合，口服服用

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
UPT04	Uptravi tab 200mcg	Selexipag tab 200mcg	尚達利膜衣錠 200 毫克	膜衣錠	需整粒吞服，不可將藥錠剝半、壓碎或咀嚼，並應以白開水吞服。
UPT01	Free-Uptravi tab 200mcg	Selexipag tab 200mcg-Free		膜衣錠	需整粒吞服，不可將藥錠剝半、壓碎或咀嚼，並應以白開水吞服。
UPT02	Free-Uptravi tab 600mcg	Selexipag tab 600mcg-Free		膜衣錠	需整粒吞服，不可將藥錠剝半、壓碎或咀嚼，並應以白開水吞服。
UPT03	Free-Uptravi tab 800mcg	Selexipag tab 800mcg-Free		膜衣錠	需整粒吞服，不可將藥錠剝半、壓碎或咀嚼，並應以白開水吞服。
AD760	Bisacodyl tab 5mg	BISACODYL TAB 5MG	秘克的腸溶糖衣錠	腸溶錠	磨粉後會破壞腸衣，降低藥效又會造成胃的刺激引起嘔吐。
BC720	Conslife tab	BISACODYL/SENNOSIDE/DIOCTYL SOD.	秘福糖衣錠	糖衣錠	必須整粒吞服，不得咬碎，且服藥前後一小時不得使用制酸劑或牛乳。
AD970	DiaLICON tab 120mg	DIALICON TAB 120MG	加利康錠	錠劑	內含 pancreatin, lipase 故建議整粒吞服。
BP430	Protase cap 280mg	PANCRELIPASE ENTERIC CAP 280MG	優妙化腸溶微粒膠囊	腸溶微粒膠囊	整粒吞服，可打開膠囊但不可磨碎。
AKY01	Akynzeo cap 300mg/0.5mg	Netupitant 300/Palonosetron 0.5	嘔可舒膠囊	膠囊	複方劑型，需整粒吞服
BS320	Stroccain TAB	OXETHAZAINE 5MG/POLYMIGEL 244MG	息痛佳音錠	錠劑	內含麻醉性止痛成分，應整粒吞服，不可咀嚼或咬碎以免產生麻木感。
DEX01	Dexlansoprazole cap 60mg	DEXLANSOPRAZOLE SR CAP 60MG	得喜胃通 60 毫克緩釋膠囊	緩釋膠囊	必須整粒吞服，若無法整粒吞服時可打開膠囊，將藥粉顆粒灑入 1 湯匙果醬內立刻服下，不可咀嚼藥粉顆粒。

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
AE320	Esomeprazole tab	Esomeprazole tab 40mg	耐適恩錠	腸溶錠	必需整顆吞服，不要咀嚼、或壓碎藥錠。由 N-G 給藥 時，可將藥錠放入 50 ml 水中，不可使用其他液體，以 免腸衣膜被破壞；待藥錠溶解後，立即或於 30 分鐘內 由 N-G 給藥，再以至少 30 ml 的水沖 N-G 管子使藥物 完全進入胃內。
AL680	(口)Takepron OD tab 30mg	LANSOPRAZOLE OD TAB 30MG	泰克胃通口溶錠 30	腸溶性細粒之口溶錠	將本藥置於舌頭上，可立即溶解，勿咀嚼，直接吞服，或配適量溫開水吞服。可剝半但不可磨。經由鼻胃管給藥時，將藥錠放入針筒中，抽取約 10 ml 的水；輕搖以使快速崩解；藥錠崩散後，請於 15 分鐘內經由鼻胃管給藥；針筒重新抽取約 5 ml 的水，輕搖後用以沖洗鼻胃管。
AO170	Omelon cap 20mg	OMEPRAZOLE CAP 20MG	護胃康腸溶微粒膠囊	腸溶微粒膠囊	腸溶微粒膠囊， 建議整粒吞服，膠囊內的藥粒不可磨碎、咀嚼或切割藥粒。 可將膠囊內的藥粒撒在少量的食物上服用；混合後，應立刻用水吞下不要咀嚼，全部吃完，不可將這混合物儲存以備將來服用。
PAN01	Panho tab 40mg	PANTOPRAZOLE TAB 40MG	盼胃好腸溶膜衣錠	腸溶錠	磨粉後破壞腸衣，故建議整粒吞服。宜餐前一小時空腹服用
AP110	Pantoloc tab 40mg	PANTOPRAZOLE TAB 40MG	治潰樂腸溶膜衣錠	腸溶錠	磨粉後破壞腸衣，故建議整粒吞服。宜餐前一小時空腹服用
RAB01	Rabe tab 20mg	Rabeprazole tab 20mg	止潰腸溶膜衣錠 20 毫克	腸溶膜衣錠	本藥為腸溶膜衣錠，不宜嚼碎或壓碎，應整顆吞服。
AG080	Gastro-Timelets	METOCLOPRAMIDE SR CAP 30MG	胃斯妥持效膠囊	持效膠囊	持效膠囊需整粒吞服，不可剝開或咀嚼服用
BM460	(顆粒) Pentasa gran. 2G	MESALAZINE PR Granules 2g	頗得斯安顆粒劑 2 g	持續性藥效顆粒劑	直接將顆粒劑倒在舌頭上，用水或果汁吞服，不可咀嚼。

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
MEZ01	Mezavant XL tab 1.2g	MESALAZINE TAB 1200MG	安適凡特長效腸溶錠	長效腸溶錠	必須整粒吞服，不可嚼碎或剝半
BM420	800mg AsacoL tab	MESALAZINE TAB 800MG	阿賜克錠 8 0 0 毫克	腸溶膜衣錠	本錠劑必須整粒吞服，不可嚼碎或折半。
CHO01	Cholbam cap 50mg	Cholic acid cap 50mg	酷立酸膠囊	膠囊	應跟食物一起服用。不要壓碎或咀嚼膠囊。 不能吞嚥膠囊的病人，可以將膠囊打開並將其內容物混入嬰兒配方奶或擠出的母乳（對於年幼的孩子）、或軟質的食物：如馬鈴薯泥或蘋果泥（對於年齡較大的兒童以及成人），以便掩蓋任何不愉快的味道。
MET14	Metalcaptase tab 300mg	D-Penicillamine tab 300mg	滿克特膜衣錠	膜衣錠	不宜磨粉
AD720	Metalcaptase-300	D-PENICILLAMINE TAB-300MG	滿克特膜衣錠	膜衣錠	不宜磨粉。
MET17	MetaCu cap 300mg	Trientine cap 300mg		膠囊	應整粒吞服，不可以打開或咀嚼，因其成分對黏膜有刺激性。
BT390	Trientine 300mg	TRIENTINE CAP 300MG		膠囊	應整粒吞服，不可以打開或咀嚼，因其成分對黏膜有刺激性。
VIV01	Viviant tab 20mg	Bazedoxifene tab 20mg	芬安膜衣錠 20 毫克	膜衣錠	不宜磨粉；可能致畸胎(teratogenic potential)，應避免皮膚直接接觸。
AR070	Evista tab 60mg	Raloxifene tab 60mg	鈣穩膜衣錠	錠劑	不宜磨粉；致畸胎可能(teratogenic potential)，避免皮膚直接接觸。
RAL01	Ralox F.C. tab 60mg	Raloxifene tab 60mg	骨鬆膜衣錠 60 毫克	膜衣錠	不宜磨粉；致畸胎可能(teratogenic potential)，避免皮膚直接接觸。
BM350	C.T.L. XR tab500mg	METFORMIN TAB 500MG	驅糖樂持續錠	持續釋放錠	可剝半，但不可以壓碎或研磨。磨粉後破壞控制釋放的設計

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
GLU10	Glucomin X.R. tab 500mg	Metformin tab 500mg	立克醣緩釋錠 500 毫克	持續釋放錠	可剝半，但不可以壓碎或研磨。磨粉後破壞控制釋放的設計
QTE01	Qtern tab 5mg/10mg	Saxagliptin/Dapagliflozin 5/10mg	控糖穩膜衣錠 5 毫克 /10 毫克	膜衣錠	請整錠吞服，勿壓碎、切開或咀嚼
KOM10	Kombiglyze XR tab 5/1000	SAXAGLIPTIN/METFOR MIN XR 5/1000	康併莎 5/1000 毫克	持續釋放錠	康併莎持續性藥效膜衣錠必須整粒吞服，絕不可磨碎、切割或嚼碎。
XIG01	Xigduo XR tab 10/1000mg	Dapagliflozin/Metformin 10/1000	釋多糖持續藥效膜衣 錠 10/1000 毫克	持續性膜衣錠	XIGDUO XR 錠必須整粒吞服，切勿磨碎、切割或嚼碎。
AG630	60mg Diamicon MR	GLICLAZIDE MR TAB 60MG	岱蜜克龍持續錠 6 0	持續釋放錠	磨粉後破壞控制釋放的設計。
AG450	Diabetrol tab 10mg	GLIPIZIDE SR TAB 10MG	糖舒平長效錠 1 0 M	長效錠	磨粉後破壞控制釋放的設計。
OSE01	Oseni Tablets 25mg/30mg	Alogliptin/PIOGLITAZON E 25/30mg	歐欣尼膜衣錠 25/30 毫 克	膜衣錠	Oseni 應每日一次，隨餐或空腹後服用。必須整錠吞服，不可剝開。
ACA03	Acarizax lyophilisate 12SQ-HDM	Acarizax lyophilisate 12SQ-HDM	阿克立舌下錠 12 SQ-HDM	舌下錠	舌下錠，不可磨粉
AI590	Isotretinoin cap 20mg	Isotretinoin cap 20mg	羅可坦軟膠囊	軟膠囊	具黏膜刺激性及致畸胎性，不宜磨粉或咀嚼。
AO330	Oxbu extend tab5mg	OXYBUTYNIN EXTEND TAB 5MG	歐舒緩釋錠 5 毫克	持續釋放錠	持續釋放錠，應整粒吞服，不能咀嚼或壓碎，可剝半使用。
SOL06	Solinacin F.C. tab 5mg	Solifenacin succinat tab 5mg	中化利平順膜衣錠 5 毫克	膜衣錠	本品帶有苦味，建議不要將膜衣錠嚼碎或研碎使用，需整粒吞服。

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
BS500	Vesicare tab 5mg	SOLIFENACIN SUCCINAT TAB 5MG	衛喜康膜衣錠 5 毫克	膜衣錠	不宜磨粉，需整粒吞服（因味苦具刺激性）
BT410	Detrusitol SR 4mg	TOLTERODINE SR CAP 4MG	得舒妥持續性膠囊	持續性膠囊	磨粉後破壞控制釋放的設計。
BET02	25mg Betmiga tab	Mirabegron PR tab 25mg	貝坦利持續性藥效錠 25 毫克	持續性藥效錠	可隨餐或空腹服用，應以水整粒吞服，不可嚼碎、切割或壓碎。
BET04	50mg Betmiga tab	Mirabegron PR tab 50mg	貝坦利持續性藥效錠 50 毫克	持續性藥效錠	可隨餐或空腹服用，應以水整粒吞服，不可嚼碎、切割或壓碎。
AP630	Phyllocontin 225mg	PHYLLOCONTIN 225MG	菲康汀持續性藥效錠	持續釋放錠	可剝半但不能咀嚼碎或壓碎，以免其中 Aminophylline 快速釋出，可能造成毒性。（依據仿單）
AT490	Xanthium cap 200mg	THEOPHYLLINE CAP 200MG	善寧持續性藥效膠囊	持續釋放膠囊	不可嚼碎或壓碎其內顆粒。
XAN02	Xanthium cap 200mg	Theophylline cap 200mg	善寧持續性藥效膠囊	持續釋放膠囊	不可嚼碎或壓碎其內顆粒
DR150	MacaloL cap 0.25ug	CALCITRIOL 0.25UG	骨活醇軟膠囊	軟膠囊	液體軟膠囊，需整粒吞服，若無法吞服之患者可改用 Alfacalcidol tab.
AT590	Juvela-N cap 200mg	TOCOPHEROL CAP 200MG	高育維軟膠囊	軟膠囊	不宜磨粉。
AD990	AVOdart cap 0.5mg	DUTASTERIDE CAP 0.5MG	適尿通軟膠囊	軟膠囊	須整粒吞服；懷孕婦女或可能懷孕婦女不可以接觸此膠囊，特別是有裂損的膠囊；因 Dutasteride 可經由皮膚吸收，可能造成胎兒異常。
DUO01	DUOdart CAP 0.5/0.4mg	DUTASTERIDE/TAMSU LOSIN 0.5/0.4MG	多適達膠囊 0.5/0.4mg	膠囊	膠囊需整顆吞服，不可咀嚼、碾碎或打開使用。直接接觸硬膠囊內之 dutasteride，可能會對口咽部黏膜造成刺激。

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
AF200	Propecia tab 1mg	Finasteride tab 1mg	柔沛膜衣錠	膜衣錠	懷孕婦女或可能懷孕婦女不可以接觸到壓碎或破碎的 Finasteride 錠劑
AF690	FinTA tab 5mg	FINASTERIDE TAB 5MG	快得膜衣錠	膜衣錠	懷孕婦女或可能懷孕婦女不可以接觸到壓碎或破碎的 Finasteride 錠劑
AF190	Proscar tab 5mg	FINASTERIDE TAB 5MG	波斯卡	膜衣錠	懷孕婦女或可能懷孕婦女不可以接觸到壓碎或破碎的 Finasteride 錠劑
TEC06	Tecfidera cap 240mg	Dimethyl fumarate cap 240mg	泰福德膠囊 240 毫克	膠囊	腸溶衣膠囊應整粒吞服，不要壓碎、溶解、拆開或咀嚼，避免腸道刺激。
PLU01	PlusDmax 70mg+D3-2,800iu	Alendronate plus 70mg+D3-2,800iu	杏節挺錠	錠劑	主成分 Alendronate 對食道黏膜具刺激性，需整粒吞服，不宜剝半、磨粉；服用時須配服一大杯水。由 N-G 給藥時，可將藥錠以約 10mL 的水溶解後，立即給藥再以 50 mL 的水沖 N-G 管子使藥物完全進入胃內。
FOS01	Fosamax Plus 70+5,600U	Alendronate plus 70mg+D3-5,600U	福善美保骨錠 70+5,600U	錠劑	主成分 Alendronate 對食道黏膜具刺激性，需整粒吞服，不宜剝半、磨粉；服用時須配服一大杯水。由 N-G 給藥時，可將藥錠以約 10mL 的水溶解後，立即給藥再以 50 mL 的水沖 N-G 管子使藥物完全進入胃內。
BIN01	Binosto tab 70mg	Alendronate tab 70mg	骨密妥發泡錠	發泡錠	此發泡錠需溶於 120 西西白開水，發泡停止後等待至少 5 分鐘，攪拌 10 秒後喝下，不可嘗試吞食、咀嚼、或吸食發泡錠，因為可能會造成口咽部潰瘍。請於當天首次進食、服用飲料、或其他藥物至少 30 分鐘之前喝完口服液劑。服用完骨密妥發泡錠後至少 30 分鐘及至當天首次進食前，請避免躺臥。
AC430	Bonefos cap 400mg	CLODRONATE 400MG	骨復舒膠囊	膠囊	主成分 Clodronate 對食道黏膜具刺激性，建議整粒吞服。

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
BC590	Sinclote cap 400mg	CLODRONATE CAP 400MG	杏骨樂膠囊	膠囊	主成分 Clodronate 對食道黏膜具刺激性，建議整粒吞服。
REO01	Reosteo tab 35mg	Risedronate tab 35mg	瑞骨卓 35 毫克	膜衣錠	主成分對食道黏膜具刺激性，需整粒吞服，不宜剝半、磨粉；服用時須配服一大杯水。
OLU01	Olumiant tab 4mg	Baricitinib tab 4mg	愛滅炎膜衣錠 4 毫克	膜衣錠	不可剝半，應整顆服用
AUB01	Aubagio film coated tab 14 mg	Teriflunomide tab 14 mg	歐博捷膜衣錠 14 毫克	膜衣錠	味道很苦，不建議剝半或磨粉。
XEL02	(XR) 11mg Xeljanz tab	Tofacitinib XR tab 11mg	捷抑炎持續性藥效錠 11 毫克	持續性藥效錠	需整粒吞服不可壓碎、剝半或咀嚼
SYM01	Smyraf film-coated tab 50mg	Peficitinib film-coated tab 50mg	施覓福膜衣錠 50 毫克	膜衣錠	需整粒吞服不可壓碎、剝半或咀嚼
BS030	100mg Sandimmun cap	100MG CICLOSPORIN CAP	新體睦軟膠囊	軟膠囊	膠囊需整顆吞服
BS040	25mg Sandimmun cap	25MG CICLOSPORIN CAP	新體睦軟膠囊	軟膠囊	膠囊需整顆吞服
AE660	Certican tab0.25mg	EVEROLIMUS TAB 0.25MG	卓定康錠 0.25 毫	錠劑	具黏膜刺激性，不宜磨粉。服藥時須整顆藥錠吞服並以整杯水配服，不可咀嚼或咬碎錠劑。避免接觸壓碎的錠劑。若病人無法吞藥，於服藥時可先將藥錠放入裝有 30mL 水的容器中，溫和攪拌後立即服用；再以 30mL 水潤洗容器後服下。
AE670	0.5mg Certican tab	EVEROLIMUS TAB 0.5MG	卓定康錠 0.5 毫克	錠劑	具黏膜刺激性，不宜磨粉。服藥時須整顆藥錠吞服並以整杯水配服，不可咀嚼或咬碎錠劑。避免接觸壓碎的錠劑。若病人無法吞藥，於服藥時可先將藥錠放入裝有 30mL 水的容器中，溫和攪拌後立即

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	劑型	研磨建議(藥品手冊)
					服用；再以 30mL 水潤洗容器後服下。
AM950	CellCept cap 250mg	MYCOPHENOLATE MOFETIL CAP 250MG	山喜多膠囊	一般膠囊	需整粒吞服；可能致畸胎，避免直接皮膚接觸。
AM980	Myfortic tab 180mg	MYCOPHENOLATE TAB 180MG	睦體康腸衣錠	腸溶錠	需整粒吞服；可能致畸胎，避免直接皮膚接觸。
RAP01	0.5mg SIROlimus tab	Sirolimus tab 0.5mg	斥消靈錠 0.5 毫克	糖衣錠	它是一種利用 NanoCrystal technology 做成的特殊劑型，必須整粒吞服，不可以嚼碎、弄破或搗碎。
AS460	Tab SIROlimus 1mg	Sirolimus tab 1mg	斥消靈錠 1 毫克	糖衣錠	它是一種利用 NanoCrystal technology 做成的特殊劑型，必須整粒吞服，不可以嚼碎、弄破或搗碎。
KRE10	Kremezin 2gm/pkg	SPHERICAL ABSORPTIVE CARBON 2GM	克裏美淨細粒	粉劑	在高溫下氧化還原球型活性碳而得到之球狀具吸附力之黑色球型小顆粒，需直接服用，不可以再磨粉

附註：具有致癌性(carcinogenic)、致畸胎性(teratogenic)、細胞毒性(cytotoxic)的藥物不適合磨粉，因為散發的藥物微粒或粉塵可能會傷害給藥的照護者。

參考來源：

- 1.藥品仿單
- 2.Micromedex
- 3.Lexi-Comp ONLINE
- 4.“Do Not Crush List” <http://www.ismp.org/Tools/DoNotCrush.pdf> (www.ismp.org)
5. EACS Guidelines, version 10.1, 2020