

DUPIXENT® (dupilumab)

Pre-Filled Pen 預填式注射筆： 施打操作與注意事項




圖片僅供示意

DUPIXENT (dupilumab) 預填注射筆

注射注意事項：

若醫師為您開立 DUPIXENT，或您需要為他人注射 DUPIXENT，請妥善保存此份注意事項，以協助您完成注射。請詳閱使用說明書，以充分了解 DUPIXENT 使用方式。此份文件提供注射指導資訊，僅供已由醫師開立 DUPIXENT 的病患與其照顧者使用。

掃描觀看
注射教學影片



備齊注射用品

將注射筆置放在平坦表面，讓注射筆於室溫下 (25°C 以下) 自然回溫

從冰箱取出注射筆後，請等待一段時間讓注射筆自然回溫
(300 mg：至少 45 分鐘
200 mg：至少 30 分鐘)

備齊並檢查注射用品


A3 檢查注射筆標籤與有效期限，確認您即將使用的產品與劑量是正確的

若藥物已過期，請勿使用

透過注射筆的劑量窗口檢查藥物，確認液體是否為清澈無色至淺黃色；若液體變色或混濁，或含有肉眼可見的碎片或顆粒，請勿使用注射筆

將注射筆放在平坦表面，並參考建議回溫時間，讓注射筆於室溫下 (25°C 以下) 自然回溫

注意：DUPIXENT 需在離開冰箱後的 14 天內使用完畢，若未使用需丟棄



■ 照顧者給藥或自行注射 ■ 請由照顧者給藥

注射前置工作

B1 選擇注射部位

DUPIXENT 為皮下注射。您可以注射於大腿或肚子，並避開肚臍周圍 5 公分的範圍。若由照顧者注射，也可以選擇注射於上臂

注射部位可以重複；不過仍需留意，每次注射皆需更換注射部位

請勿注射於皮膚上具有任何壓痛、受損、疤痕或瘀青的部位

若有使用其他注射藥物，請勿將 DUPIXENT 注射於相同部位

注意：自行注射可注射於大腿或肚子 (避開肚臍周圍 5 公分範圍)；由照顧者注射可注射於大腿、肚子或上臂



捏起皮膚並放置



按壓並維持

將注射筆緊貼皮膚，開始注射



觀察

觀察注射筆上的劑量窗口，若完全轉為黃色表示注射完成，可移除注射筆

注射

C1 取下筆蓋：當您取下筆蓋時，可能會在針蓋上發現小水珠，這是正常現象

C2 捏起皮膚並放置：對於 2 歲以上至 12 歲以下的病患，注射時可捏起皮膚維持緊繃狀態，這個步驟可讓注射過程更舒適。將針蓋以 90 度角放在皮膚上，以便看見劑量窗口

C3 壓下：將注射筆緊緊按在您的皮膚上，直至看不到針蓋為止。開始注射後您會聽到咔嚓聲，並看見劑量窗口逐漸變成黃色

C4 緊握並確認黃色劑量窗口：持續將注射筆緊靠在您的皮膚上，直到整個劑量窗口變成黃色。您可能會聽到第二聲咔嚓聲。當您確認整個劑量窗口變成黃色時 (約需 15 秒)，慢慢數到 5 後將注射筆從皮膚上拿起。(如果劑量窗口沒有完全變黃，請取出注射筆並連絡您的醫療人員)

C5 移除：當您移除注射筆，您可能會在皮膚上看到小水珠，這是正常現象

D 棄置：請勿重新蓋上筆蓋。將使用過的注射筆、筆蓋與其他用品分別丟棄於防穿刺容器內

