





編號	26	名稱	<p align="center">核醫梅克爾憩室掃描 (Scan for Meckel's diverticulum)</p>	修訂日期	2019/09/20
				修訂版次	第7版
主要目的		<p>一、梅克爾憩室之偵測。 二、腹部異位性胃黏膜之偵測。</p>			
檢查流程		<ol style="list-style-type: none"> 1. 造影檢查前至少禁食 4 小時以上。 2. 核醫科櫃檯報到後，請至休息區等候，會有人呼叫您的名字，通知您解小便，再至核醫造影室。 3. 先平躺於檢查床，靜脈注射核醫藥物：Tc-99m pertechnetate。 4. 注射核醫藥物後，立即、5、15、30、60 分鐘，進行從肝下緣到骨盆腔前方之造影。如有需要會增加局部造影。造影檢查時，只需靜靜躺著，並不會痛苦。 5. 檢查間隔期間，請至休息區等候，會有人呼叫您的名字。但請暫時仍不要進食，直到檢查結束。 6. 若有需要，會進行單光子斷層掃描(360 度掃描)，時間約 30 分鐘。 			
		 			
注意事項		<ol style="list-style-type: none"> 1. 若您有懷孕的可能，可能暫時不宜進行本項檢查，請事先告知我們。 2. 建議不要穿戴有金屬物的衣服及配件(如：金屬扣皮帶)。 3. 建議於檢查結束後多喝水、多上廁所，以促進核醫藥物的排泄。 4. 在造影前先解小便，請注意避免尿液污染到衣褲及皮膚。 5. 造影檢查過程，並不會痛苦，請儘量不動，如此可以提高影像的品質。 6. 本項檢查罕見有過敏等副作用。 7. 本項檢查所用藥物雖具放射性，其半衰期只有6小時且非常微量，基本上並不會對您或家人造成傷害，請放心。但為維護兒童與孕婦之權益，注射後24小時內請盡量減少近距離相處（一公尺以內稱近距離）。 			
<p>有任何疑問歡迎與核醫科聯絡： 聯絡電話：04-23592525轉4801 Email：nm@vghtc.gov.tw</p>					