



新冠肺炎口服藥

Paxlovid 使用說明

請您按時服藥，若有問題請撥打：

04-23592525 分機 4647

祝您早日康復！臺中榮總藥學部關心您！

重度腎功能不良病人服用方法

第一天



內含：
1顆白色藥錠+
2顆粉紅色藥錠

第二至五天



內含：
1顆白色藥錠+
1顆粉紅色藥錠

臨床用途 輕度至中度新型冠狀病毒疾病(COVID-19)感染

使用方法

1. 可空腹或隨餐服用，應**整粒吞服**，不可嚼碎或磨粉
2. 本藥會與許多藥物產生交互作用而影響療效或增加副作用，請主動告知醫師/藥師您目前的用藥
3. 請**務必連續服完5天的藥量**，以提高病毒清除率

忘記服藥 若忘記吃藥，在**原定服藥時間8小時內可補服**藥品；若**超過8小時則不需補服**，直接於下一個服藥時間服用藥品即可（切勿服用兩倍的劑量）

可能產生之副作用 目前已知可能產生的副作用如下，如果服用後產生嚴重不適情況，請至醫療院所就診：

1. **肝臟問題病徵**：食慾不振、皮膚和眼白發黃(黃疸)、尿液顏色變深、糞便顏色變淺、皮膚發癢及胃部(腹部)疼痛。
2. **對HIV藥物產生耐藥性**：如為HIV感染者，同時使用Paxlovid治療可能會導致某些HIV藥物無法正常發揮其治療功效。

3. **其他副作用**：味覺改變、腹瀉、高血壓及肌肉痠痛等。
請注意並非所有與COVID-19治療相關之風險和副作用皆已知。醫師可能會給予藥物來幫助減輕副作用，若服用後仍不適，請至醫療院所就診。



用藥指導
單張



新冠肺炎口服藥

Paxlovid使用說明

請您按時服藥，若有問題請撥打：

04-23592525 分機 4647

祝您早日康復！臺中榮總藥學部關心您！

重度腎功能不良病人服用方法

第一天



內含：
1顆白色藥錠+
2顆粉紅色藥錠

第二至五天



內含：
1顆白色藥錠+
1顆粉紅色藥錠

臨床用途 輕度至中度新型冠狀病毒疾病(COVID-19)感染

使用方法

1. 可空腹或隨餐服用，應**整粒吞服**，不可嚼碎或磨粉
2. 本藥會與許多藥物產生交互作用而影響療效或增加副作用，請主動告知醫師/藥師您目前的用藥
3. 請**務必連續服完5天的藥量**，以提高病毒清除率

忘記服藥 若忘記吃藥，在**原定服藥時間8小時內可補服**藥品；若**超過8小時則不需補服**，直接於下一個服藥時間服用藥品即可（切勿服用兩倍的劑量）

可能產生之副作用 目前已知可能產生的副作用如下，如果服用後產生嚴重不適情況，請至醫療院所就診：

1. **肝臟問題病徵**：食慾不振、皮膚和眼白發黃(黃疸)、尿液顏色變深、糞便顏色變淺、皮膚發癢及胃部(腹部)疼痛。
2. **對HIV藥物產生耐藥性**：如為HIV感染者，同時使用Paxlovid治療可能會導致某些HIV藥物無法正常發揮其治療功效。
3. **其他副作用**：味覺改變、腹瀉、高血壓及肌肉痠痛等。

請注意並非所有與COVID-19治療相關之風險和副作用皆已知。醫師可能會給予藥物來幫助減輕副作用，若服用後仍不適，請至醫療院所就診。



用藥指導
單張