

臺中榮總 兒科適用水劑藥品清單

藥品成份/商品名	成份含量	一般劑量
Analgesics/Antipyretics (止痛退燒藥)		
* Acetaminophen <i>Anti-phen®syrup</i> 安佳熱糖漿	24 mg/ml, 60ml/bot	Fever: 10-15 mg/kg/dose PO Q4H-Q6H, maximum 5 doses/day
Ibuprofen <i>Ibuprofen oral® susp</i> 依普芬口服懸液劑	20 mg/ml, 60 ml/bot	6 m/o-12 yrs: 0.25-0.5 ml/kg
Epectorants (祛痰劑)		
Ambroxol <i>Soltan®sol'n 100mL</i> 舒痰液	3 mg/ml, 100 ml/bot	< 2 yrs: 1.2-1.6 mg/kg/day (分2次服用) 2-5 yrs: 2.5 ml BID
Mucolytic Drugs (黏液溶解劑)		
* Bromhexine <i>Bisolvon® solution</i> 氣舒痰液	2 mg/ml, 50 ml/bot	Infant : 0.5ml TID 5 yrs : 1ml TID 5-10 yrs: 2 ml TID
Antitussives (鎮咳劑)		
Butamirate citrate <i>Sutussi®liquid</i> 停咳喜液	0.8 mg/mL, 120 mL/bot	Adults : 20-25 mg QID ≥ 12 years : 15-22 mg QID 6-12 years : 6-15 mg (7.5-15 ml) QID 3-6 years : 5-6 mg (7.5 ml) QID 1-3 years : 3 mg (3.75 mL) QID 2 month-1 years : 2 mg (2.5 ml) QID
Antihistamines (抗組織胺藥)		
* Cetirizine HCl <i>Cetirizine®Sol'n</i> 勝克敏液	1 mg/ml, 60 ml/bot	3-6 y/o: 5 ml/day QD~BID >6 y/o: 10 ml QD
* Cyproheptadine HCl <i>Cyproh®syrup</i> 喜普液	0.4 mg /ml, 60 ml/bot	2-6 yrs: 5 ml TID 6-14yrs : 10 ml TID
Ketotifen <i>Athmin®syrup</i> 喘敏糖漿	0.2 mg/ml, 60ml/bot	0.5-2 mg BID
* Loratadin <i>Clatine®syrup</i> 宜敏靜糖漿	1 mg/ml, 60 ml/bot	2-12 yrs: ≤ 30 kg: 5 mg QD >30 kg: 10 mg QD
Autonomic-β-Adrenergic Agonists		
* Procatamol <i>Meptin®Liquid</i> 滅喘淨液	5 mcg/ml, 60 ml/bot	< 6 y/o: 10-15 mcg QD > 6 y/o: 25 mcg QD-BID

臺中榮總 兒科適用水劑藥品清單

藥品成份/商品名	成份含量	一般劑量
Respir. Smooth Muscle Relax. (呼吸系統平滑肌鬆弛劑)		
* Theophylline <i>Centertheo®liquid</i> 適優喘液	5.34 mg/ml, 60 ml/bot	6-12 yrs: 125-250 mg Q6H (3 ml/kg/day Q8-6H or 1 ml/kg/dose)
Misc. Respiratory Tract Agents (其他呼吸道治療劑)		
Chlorpheniramine + Methylephedrine + guaiacoL <i>Secorine®syrup</i> 息咳寧糖漿	Each ml: Chlorpheniramine 0.1mg + Methylephedrine 1mg + guaiaicol glycolate 5 mg. 120mL/bot	Adult : 20 mL 3~4 times a day. 9-12 yrs: 10 mL 3~4 times a day. 6-9 yrs: 6.7 mL 3~4 times a day.
Antibacterials (抗生素)		
* Amoxicillin <i>Amolin®oral susp</i> 萬博徵懸液用粉	50 mg/ml, 60 ml/bot	<ul style="list-style-type: none"> ● 20-40 mg/kg/day, 分3~4次服用 ● 須先加水至藥瓶上60ml之刻度，並充分振搖溶解，每次使用前也需搖勻。 ● 稀釋後需冷藏，安定性為7天。
* Amoxicillin+Potassium clavulanate <i>Curam®oral syrup</i> 諾快寧口服懸液用粉	Each 5ml: Amoxicillin 250 mg + Potassium clavulanate 62.5mg 60 ml/bot	<ul style="list-style-type: none"> ● 2-12 yrs: 30~60mg/kg/day Q8H < 2 yrs: 30~40mg/kg/day Q8H (Amoxicillin dose) ● 須先加水至瓶身凹陷標記處，並充分振搖溶解，每次使用前也需搖勻。 ● 稀釋後需冷藏，安定性為7天。
* Azithromycin <i>Zithromax®susp</i> 日舒懸液用粉	200 mg/5 ml, 15 ml/bot	<ul style="list-style-type: none"> ● <15 kg: 10 mg/kg for 3 days 15-25 kg: 200mg (5ml)/QD for 3day ● 須先加9ml水，稀釋後為15ml，並充分振搖溶解，每次使用前也需搖勻。 ● 稀釋後室溫安定性為7天。
* Clarithromycin <i>Klaricid®susp</i> 開羅理徵素懸液劑	125mg/5mL,70mL	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Infants ≥1 months, Children: 7.5 mg/kg Q12H (MAX:500mg/dose) for non-mycobacterial infections for 10 days.</i> ● <i>children with disseminated or localized mycobacterial infections: 7.5 to 15 mg/kg Q12H</i>
* Trimethoprin+ Sulfamethoxazole <i>SulfacoTrim®syr</i> 沙法克寧懸液劑	Each 5ml: Trimethoprin 40mg + Sulfamethoxazole 200mg 60ml/bot	6-10 mg TMP/kg/day, Q12H

臺中榮總 兒科適用水劑藥品清單

藥品成份/商品名	成份含量	一般劑量
Antifungals(抗黴菌)		
* Nystatin <i>Mycostatin® susp</i> 滅菌靈懸液用粉劑	100,000 U/ml, 24 ml/bot	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 ml QID (需要時可增加劑量) ● 須先加23ml水稀釋，並充分振搖溶解，每次使用前也需搖勻。 ● 稀釋後室溫安定性為7天。
Posaconazole <i>Posanol® susp</i> 波賽特口服懸液劑	40 mg/ml, 105 ml/bot	> 13 yrs : 200mg TID
Anticonvulsants (抗癲癇劑)		
* Levetiracetam <i>Keppra® oral solution</i> 優閒內服液劑	100 mg/ml, 300 ml/bottle	4-15 years: 10 mg/kg/dose BID, may increase every 2 weeks by 10 mg/kg/dose to a maximum of 30 mg/kg/dose BID.
* Oxcarbazepine <i>Trileptal® susp</i> 除癲達口服懸浮液	60 mg/ml, 100 ml/bot	4-16 yrs: 起始劑量: 8-10 mg/kg/day分2次 服用
* Valproate Sod. <i>Depakine® solution</i> 帝拔癲液	200 mg/ml, 40 ml/bot	20-30 mg/kg/day, BID - TID
Misc. Anxiolytic, Sedatives, Hypnotics (其它鎮靜安眠劑)		
Chloral hydrate 10% solution	2 mg/ml	Sedation: 25 mg/kg/day, Q8H Hypnotic: 50 mg/kg/dose
Antiflatulents (脹氣治療劑)		
* Simethicone <i>Wilcon® susp</i> 胃爾康懸浮液	20 mg/ml, 60 ml/bot	< 2 yrs : 1ml QID > 2 yrs : 2ml QID
GI Prokinetic Drugs (腸胃蠕動劑)		
* Domperidone <i>Wempty® susp</i> 胃利空懸液劑	1 mg/ml, 60 ml/bot	0.25-0.5 ml/kg/dose TID-QID, before meal
Cardiotonic Drugs (強心劑)		
* Digoxin <i>Cardiacin® elixir</i> 地高新醣劑	50 mcg/ml, 60 ml/bot	10-20 mcg/kg/day
Diuretics(利尿劑)		
* Furosemide <i>Fumide® oral solution</i> 福滿內服液劑	10 mg/ml, 120 ml/bot	<ul style="list-style-type: none"> ● 早產新生兒(<29 週): 1-2 mg/kg/dose Q24H ● 早產新生兒(>29 週): 1-2 mg/kg/dose Q12- 24H ● 新生兒: 1-3 mg/kg Q8H(需要時) ● 嬰兒及小孩: 起始劑量: 2 mg/kg/dose, 1-2 mg/kg/dose Q6-8H, MAX: 6mg/kg/dose

臺中榮總 兒科適用水劑藥品清單

藥品成份/商品名	成份含量	一般劑量
Hormones & Synthetic substitutes- Adrenals(腎上腺素)		
* Prednisolone <i>Kidsolone®oral susp</i> 必爾生口服液	1 mg/ml, 60 ml/bot	遵照醫囑
Immunosuppressive Agents		
* Cyclosporin <i>Sandimmun®sol'n</i> 新體睦口服溶液	100mg/ml, 50 ml/Bot	依各疾病適量投與，必要時依血中濃度調整劑量
Iron Preparations (鐵製劑)		
* <i>Ferrum Hausmann®</i> 富鐵好滴劑	50 mg iron /ml (1drop = 2.5 mg iron) 30 ml/bot	<i>Infants:</i> Begin with 6 drops daily and gradually increase to 20 drops daily <i>Children:</i> 20 drops 1-2 times daily
Replacement Preparations (取代用藥)		
<i>Neutral Phosphate solution</i> powder/pack	Phosphorus: 200 mg/10ml Sodium: 1.08 mEq/ml 500 ml/bot	視需要適量投與

- *有此星號標示之水劑為本院另有口服錠劑或膠囊劑型，因此對於較小的幼兒病患，請醫師們儘量開立水劑藥品。
- 滑鼠點選藥理分類標題即可超連結藥品手冊查詢系統。

藥學部 2017-03更新