


		臺 中 榮 民 總 醫 院 Taichung Veterans General Hospital		核子醫學科 衛 教 單	
編號	24 25	名稱	核醫胃排空檢查(固體或液體食物) (Gastric Emptying Time) (Solid or liquid)	修訂日期	2025/01/01
				修訂版次	第12版
主要目的		胃排空異常的偵測。			
檢查流程		1. 檢查前 24 小時內停止服用會影響胃排空的藥物，而且最好不要吸煙，因尼古丁也可能會影響胃的排空。 2. 檢查前至少禁食 8 小時以上。 3. 核醫科櫃檯報到後，請到叫號機插健保卡抽取號碼牌，並請依照語音指示進行後續檢查流程，先至第 4 造影室插卡報到，再至休息區等候。 4. 輪到您時，叫號系統會呼叫您的號碼，通知您解小便，再至核醫造影室。 5. 如廁後請至造影室，依食物種類不同執行下列流程： A. 固體食物：先依放射師指示吃一份三明治餐（已標記 Tc-99m 之藥物，例如 DTPA），10 分鐘內吃完，吃完馬上平躺在檢查床進行造影檢查，約 90 分鐘，即完成檢查。 B. 液體食物：先依放射師指示喝約 250 毫升葡萄糖水（已標記 Tc-99m 之藥物，例如 DTPA），再喝約 250 毫升葡萄糖水，請盡快喝完，喝完馬上平躺在檢查床進行造影檢查，連續造影約 30 分鐘，即完成檢查。 C. 半固體食物：先依放射師指示吃一份麥片餐（已標記 Tc-99m 之藥物，例如 DTPA），請盡快吃完，吃完馬上平躺在檢查床進行造影檢查，約 90 分鐘。另依需要可能於二，三，四小時再次接受約 30 秒的造影。			
		 			
注意事項		1. 若您有懷孕的可能，可能暫時不宜進行本項檢查，請事先告知我們。 2. 建議不要穿戴有金屬物的衣服及配件(如：金屬扣)。 3. 建議於檢查結束後多喝水、多上廁所，以促進核醫藥物的排泄。 4. 造影檢查過程，並不會痛苦，請儘量不動，如此可以提高影像的品質。 5. 本項檢查罕見有過敏等副作用。 6. 本項檢查所用藥物雖具放射性，其半衰期只有6小時且非常微量，基本上並不會對您或家人造成傷害，請放心。但為維護兒童與孕婦之權益，檢查24小時內請盡量減少近距離相處（一公尺以內稱近距離）。			
有任何疑問歡迎與核醫科聯絡： 聯絡電話：04-23592525轉4801 Email：nm@vghtc.gov.tw					