





編號	62	名稱	<p>核醫鐳223癌症骨轉移治療 (Radium-233 Therapy)</p>	修訂日期	2021/02/23
				修訂版次	第1版
主要目的		<p>一、治療去勢抗性攝護腺癌 (castration-resistant prostate cancer) 病人，其合併有症狀的骨轉移且尚未有臟器轉移者。</p>			
檢查流程		<ol style="list-style-type: none"> 1. 請於治療前將抽血檢查單執行完畢。 2. 核醫科櫃檯報到後，請至休息區稍候，輪到您時，會有人呼叫您的名字。 3. 至注射室接受靜脈注射核醫藥物：Radium-233。 4. 完成靜脈注射鐳 223藥物後即可離開醫院。 5. 若有需要，會進行一次造影檢查，約須等候二至六小時，等候期間可自行活動，並可以進食。 6. 依約定時間至休息區等候照相，輪到您時，技術師會呼叫您的名字，並通知您先解小便。 7. 造影檢查時，只需靜靜躺著，並不會痛苦。造影從頭照到腳，約需時20分鐘。 			
 					
注意事項		<ol style="list-style-type: none"> 1. 本項檢查前並不需特別的準備，不需禁食。 2. 建議不要穿戴有金屬物的衣服及配件(如：項鍊)。 3. 治療前四天起要停止服用鈣片與維生素 D。 4. 接受治療後不需要隔離，可照常進行一般社交活動，不會對周遭的人造成放射線危害。 5. 在接受治療後的一星期內，請採坐姿解尿，每次上完廁所後，使用過的衛生紙丟入馬桶內隨排泄物一併沖走，請放下馬桶蓋沖水兩次，並且徹底清潔手部。 6. 若有體液、排泄物需要清理，請以衛生紙擦拭後投入馬桶內沖走。若是衣物、床單遭沾染，請隨即單獨清洗。 7. 治療期間以及治療後 6個月內必須使用有效的避孕方式。 			

有任何疑問歡迎與核醫科聯絡：

聯絡電話：04-23592525轉4801

Email：nm@vghtc.gov.tw