



編  
號

14

名  
稱

核醫淋巴攝影  
(Lymphoscintigraphy)

修訂日期

2019/09/20

修訂版次

第8版

主要目的

- 一、淋巴瘤輔助診斷。
- 二、惡性腫瘤淋巴轉移的診斷。
- 三、先天性或寄生蟲病所致淋巴系嚴重梗阻的診斷。

檢查流程

1. 核醫科櫃檯報到後，請至休息區稍候，輪到您時，會有人呼叫您的名字，通知您先解小便，再至造影室。
2. 至造影室，平躺於檢查床，醫師會於您的雙腳大腳指及第二腳指間的部位進行皮內注射核醫藥物：Tc-99m phytate。【若檢查部位不同，注射位置可能不同】
3. 皮內注射會有些疼痛，但注射量非常少（約0.1c.c.），注射時請忍耐，不要移動。
4. 注射後立即進行造影，依個人淋巴流速不同，造影時間亦有不同。通常需時由30分鐘至2小時不等。造影檢查時，只需靜靜躺著，並不會痛苦。



注意事項

1. 若您有懷孕的可能，可能暫時不宜進行本項檢查，請事先告知我們。
2. 本項檢查前並不需特別的準備，不需禁食。
3. 建議不要穿戴有金屬物的衣服及配件(如：足鍊)。
4. 建議於注射後多喝水、多上廁所，以促進核醫藥物的排泄。
5. 在造影前先解小便，請注意避免尿液污染到衣褲及皮膚。
6. 造影檢查過程，並不會痛苦，請儘量不動，如此可以提高影像的品質。
7. 本項檢查罕見有過敏等副作用。
8. 本項檢查所用藥物雖具放射性，其半衰期只有6小時且非常微量，基本上並不會對您或家人造成傷害，請放心。但為維護兒童與孕婦之權益，注射後24小時內請盡量減少近距離相處（一公尺以內稱近距離）。

有任何疑問歡迎與核醫科聯絡：

聯絡電話：04-23592525轉4801

Email：nm@vghtc.gov.tw