

## 特殊作業檢查—22 聯吡啶或巴拉刈作業

### 一、高危險暴露族群：

巴拉刈的主要用途為除草劑、殺菌劑和殺蟲劑，1973 年引進台灣後，職業上的傷害大多來自於噴灑農藥時刺激皮膚和黏膜。

### 二、對身體健康影響：

吸入巴拉刈產生流鼻血、喉嚨痛的症狀，接觸皮膚產生腐蝕和指甲掉落，食入造成黏膜灼傷、嘔吐、腹痛、黃疸、腎臟和肺臟損害；巴拉刈中毒早期症狀為急性腎衰竭，肺臟症狀 8 到 10 天出現，多死於呼吸衰竭。

### 三、法定檢查項目：

體格檢查	健康檢查
作業經歷、生活習慣及自覺症狀之調查	作業經歷、生活習慣及自覺症狀之調查
既往病歷之調查：皮膚角化、黑斑及疑似皮膚癌症病變之疾病史。	既往病歷之調查：皮膚角化、黑斑及疑似皮膚癌症病變之疾病史。
理學檢查：皮膚及指甲系統。	理學檢查：皮膚及指甲系統。

※備註：依勞工健康保護規則所規範的檢查項目為主

### 四、健檢時需注意事項：

受檢者若有注意皮膚症狀（皮膚乾燥、紅腫、癢）、口腔黏膜潰瘍，須告知醫師，以利診斷與評估。

### 五、應考量不適合從事該業之疾病：

皮膚疾病如：接觸性皮膚炎、皮膚角化、黑斑或疑似皮膚癌病變等(參考勞工健康保護規則之建議)。