

台中榮民總醫院

胸腔外科支氣管鏡檢查說明書

胸腔外科檢查室位於門診大樓一樓東區，電話(04)23592525 轉 5055

支氣管鏡是一支直徑 0.5 公分的軟式管子，在施行咽喉局部麻醉後，經由口腔、咽喉進入氣管施行檢查。對於原因不明的咳嗽、咳血、聲音沙啞、胸腔感染、腫瘤或胸部 X 光出現異常陰影等均可由此項檢查來幫助診斷。大體言之，這是一種尚屬安全的檢查，但是仍可能發生無法防範的意外，就像例行的三餐，仍有人發生鯁噎一樣。茲列舉施行支氣管鏡檢查的禁忌症及可能發生的併發症，供您參考：

(一) 禁忌症(患以下病症者，不宜作此項檢查)

1. 最近曾發生心肌梗塞或不穩定的心絞痛。
2. 病情不穩定的支氣管哮喘。
3. 尿毒症患者。
4. 有出血傾向之患者(流血不易止血者)。
5. 活動性、開放性肺結核病人，治療少於兩個月者。

(二) 併發症

1. 檢查中可能發生心律不整、心肌缺氧(心肺功能不良者發生之機率較高)。
2. 檢查後可能引起發燒或肺部發炎(機率約 5/1000)。
3. 血壓高的病人可能引發中風。
4. 極少數患者於檢查中發生暫時性缺氧，而產生短暫的精神錯亂、幻覺、躁動、或全身僵直、無法言語、或意識不清(機率約 1/1000)。
5. 少數病人可能發生氣胸，較嚴重者需放置胸管引流(機率約 1/1000)。
6. 咽喉局部麻醉時檢查中，可能引起哮喘發作，嚴重者可致呼吸衰竭。(原有哮喘病者發生之機率較高)

雖然上述這些情況極少發生，我們也有很完善的急救設備，但是仍請您仔細的閱讀，並徵求親屬的同意，由家屬陪同前來接受檢查。

檢查前後須知

(一) 檢查前的準備

- 1、檢查前須完全禁食 4 小時以上，水也不能喝。

* 排上午檢查者：

檢查當天清晨 4 點以後，即不可吃東西或喝水，早餐不能吃。

* 排下午檢查者：

檢查當天早上九點以後，即不可吃東西或喝水，午餐不能吃。

- 2、檢查當日請攜帶健保卡並依約定時間準時至胸腔外科檢查室報道，如為住院病人則由病房工友帶領至胸腔外科檢查室報到。

- 3、請事先填好同意書，並於報到時交給檢查室人員。

(二) 檢查方法

- 1、先由口吸入麻醉藥，讓咽喉麻醉，以減輕因檢查而造成的不適。

- 2、請取入眼鏡、活動假牙。

- 3、醫師再將一條帶燈的內視鏡插入，依序檢查氣管、支氣管，並於必要時做病理切片檢查

- 4、整個過程約半小時。

(三) 檢查後須知

- 1、檢查完畢一個半小時，麻醉會慢慢消失才能進食，先喝溫水吞嚥情形良好時，再吃東西。

- 2、檢查後感到喉嚨痛及咳出少量血(此現象為氣管鏡檢查時輕微磨擦喉嚨)故請勿驚慌！

- 3、回病房如有大量咳血、呼吸困難、請立即告知護理人員，如為門診病人請盡速到急診室就醫。

- 4、檢查時若有施行切片，必須送病理部檢查並等待 5 到 7 天才能有確切之結果，請於一週後回門診看報告。

- 5、如有任何疑問，歡迎來電詢問。