	臺中榮民總醫院 Taichung Veterans General Hospital	核子醫學科 衛教單

編號	06	名稱	核醫靜脈攝影 (Radionuclide Venogram)	修訂日期	2019/09/20
				修訂版次	第10版

主要目的	評估深部靜脈栓塞的可能性。
檢查流程	1. 核醫科櫃檯報到後，請至休息區等候，會有人呼叫您的名字。 2. 先至注射室靜脈注射藥物：cold- PYP。 3. 請再回休息區等候。大約再 15-30 分鐘後，會有人通知您先解小便，再至造影室，脫去鞋襪後平躺於檢查床上。 4. 靜脈注射核醫藥物：Tc-99m pertechnetate。醫師會在您雙腳分別綁兩條止血帶（腳踝及膝蓋上方），由雙腳的腳背各打一針，隨即開始下半身的造影；鬆開止血帶後再照一次。 5. 再加照腿部局部造影。 6. 整個造影過程約需 30 分鐘左右。
注意事項	1. 若您有**懷孕**的可能，可能暫時不宜進行本項檢查，**請事先告知**我們。 2. 本項檢查前並不需特別的準備，不需禁食。但建議先用清水將腳洗乾淨，以便打針。 3. 由腳打針較不容易，請多忍耐，勿亂動。腳腫時血管會比較難找，可能需要較長的時間，還請多與醫師配合。 4. 在造影前先解小便，請注意避免尿液污染到衣褲及皮膚。 5. 造影檢查過程，並不會痛苦，機器會由腳部逐漸向腹部移動，請將手置於身側並保持不動請儘量不動，如此可以提高影像的品質。 6. 建議於注射後多喝水、多上廁所，以促進核醫藥物的排泄。 7. 本項檢查罕見有過敏等副作用。 8. 本項檢查所用藥物雖具放射性，其半衰期只有6小時且非常微量，基本上並不會對您或家人造成傷害，請放心。但為維護兒童與孕婦之權益，注射後24小時內請盡量減少近距離相處（一公尺以內稱近距離）。

有任何疑問歡迎與核醫科聯絡：

聯絡電話：04-23592525轉4801　　Email：nm@vghtc.gov.tw