

			臺 中 榮 民 總 醫 院 Taichung Veterans General Hospital		核子醫學科 衛 教 單		
編號	06	名稱	核醫靜脈攝影 (Radionuclide Venogram)			修訂日期	2025/01/01
						修訂版次	第12版
主要目的		評估深部靜脈栓塞的可能性。					
檢查流程		- 核醫科櫃檯報到後，請到叫號機插健保卡抽取號碼牌，並請依照語音指示進行後續檢查流程，先至注射室插卡報到，再至休息區等候。 - 輪到您時，叫號系統會呼叫您的號碼，先至注射室靜脈注射藥物：cold-PYP。 - 注射後，請至第 4 造影室報到機插卡報到，再回休息區等候造影。 - 輪到您時（大約 15-30 分鐘後），叫號系統會呼叫您的號碼，並通知您先解小便。 - 如廁後請至造影室，依放射師指示脫去鞋襪後平躺於檢查床上。 - 靜脈注射核醫藥物：Tc-99m pertechnetate。醫師會在您雙腳分別綁兩條止血帶（腳踝及膝蓋上方），由雙腳的腳背各打一針，隨即開始下半身的造影；鬆開止血帶後再照一次。 - 再加照腿部局部造影。 - 整個造影過程約需 30 分鐘左右。					
		 					
注意事項		- 若您有懷孕的可能，可能暫時不宜進行本項檢查，請事先告知我們。 - 本項檢查前並不需特別的準備，不需禁食。但建議先用清水將腳洗乾淨，以便打針。 - 由腳打針較不容易，請多忍耐，勿亂動。腳腫時血管會比較難找，可能需要較長的時間，還請多與醫師配合。 - 在造影前先解小便，請注意避免尿液污染到衣褲及皮膚。 - 造影檢查過程，並不會痛苦，機器會由腳部逐漸向腹部移動，請將手置於身側並保持不動請儘量不動，如此可以提高影像的品質。 - 建議於注射後多喝水、多上廁所，以促進核醫藥物的排泄。 - 本項檢查罕見有過敏等副作用。 - 本項檢查所用藥物雖具放射性，其半衰期只有6小時且非常微量，基本上不會對您或家人造成傷害，請放心。但為維護兒童與孕婦之權益，注射後24小時內請盡量減少近距離相處（一公尺以內稱近距離）。					
有任何疑問歡迎與核醫科聯絡： 聯絡電話：04-23592525轉4801 Email：nm@vghtc.gov.tw							