



編
號

44
B

名
稱

核醫餘尿及尿路逆流檢查(兒童)
(Scan of Residual Urine, UV-Reflux)

修訂日期

2022/06/13

修訂版次

第8版

主要目的

- 一、評估是否有尿路逆流。
- 二、評估解尿後膀胱的餘尿量等等。

檢查流程

1. 櫃檯報到後，會先請幼童至小兒科放置導尿管。(若有需要帶路或其他協助，請讓我們知道，另本科亦備有輪椅可供您使用。)
2. 住院之幼童若已有放置導尿管，請先不要拔除，可供此項檢查使用。
3. 完成導尿管後放置後，回到核醫科，醫護人員會從導尿管接上點滴，將核醫藥物經由點滴輸液套管加入膀胱中。
4. 點滴不滴時即表膀胱已充滿，此時請告知醫護人員。並讓幼童躺至檢查台上，開始造影。造影檢查時，只需靜靜躺著，並不會痛苦。
5. 第一次造影結束後，由醫護人員移除幼童的導尿管，待幼童排尿後再進行第二次造影。
6. 每張影像的時間約5分鐘，整個造影約需時30分鐘(依幼童的配合度不等)。
7. 若是幼童灌藥入睡才完成檢查，請喚醒之後再離開。



注意事項

1. 造影前請儘量保持幼童清醒(建議至少約3小時前)，以便幼童於造影時能安靜入睡，方便造影檢查之進行。無法配合造影的幼童，由於造影時間短，可由家屬協助稍微固定四肢以利檢查進行，通常不需要藥物灌睡(鎮靜安眠)。但有時候仍須使用藥物灌睡(需於門診事先開立)。
2. 接受本項檢查時，衣物可能會被尿液污染，請多準備一套衣物及尿片。
3. 因放置導尿管的緣故，少數幼童會有些微血尿的現象，此情形會漸漸改善，若2日後仍持續或是出血量大，請諮詢幼童的小兒科醫師。
4. 檢查當日請不要穿戴有金屬物的衣服及配件(如：金屬扣皮帶)。
5. 本項檢查罕見有過敏等副作用。
6. 本項檢查所用藥物雖具放射性，其半衰期只有6小時且非常微量。基本上並不會對您或家人造成傷害，請放心。但為維護兒童與孕婦之權益，注射後24小時內請盡量減少近距離相處(一公尺以內稱近距離)。

有任何疑問歡迎與核醫科聯絡：

聯絡電話：04-23592525轉4801

Email：nm@vghtc.gov.tw