

			臺 中 榮 民 總 醫 院 Taichung Veterans General Hospital		核子醫學科 衛 教 單	
編號	60	名稱	核醫淋巴攝影(前哨淋巴結) (Lymphoscintigraphy for Sentinel lymph node)		修訂日期	2025/03/07
					修訂版次	第10版
主要目的		定位前哨淋巴結，以利外科手術時同時進行淋巴結摘取，並做進一步病理切片評估。				
檢查流程		1. 核醫科櫃檯報到後，請到叫號機插健保卡抽取號碼牌，並請依照語音指示進行後續檢查流程，先至注射室插卡報到，再至休息區等候。 2. 輪到您時，叫號系統會呼叫您的號碼。至注射室，並依技術師指示平躺於檢查床上，醫師會於您的乳暈旁或腫瘤周圍皮內注射核醫藥物：Tc-99m phytate。 3. 皮內注射會有些疼痛，但注射量非常少（約0.1 ml），注射時請忍耐，不要移動。 4. 注射後，至第4造影室報到機插卡報到，並在休息區等候（大約注射後30分鐘至1小時）。 5. 輪到您時，叫號系統會呼叫您的號碼，並通知您先解小便。 6. 如廁後請至造影室，依放射師指示平躺於檢查床上進行掃描定位。造影定位時間約10分鐘。造影檢查時，只需靜靜躺著，並不會痛苦。 7. 如有前哨淋巴結出現，我們會在您的皮膚用筆劃上記號，以幫助您的外科醫師手術時方便找尋，請勿洗去。 8. 依個人淋巴流速不同，前哨淋巴結出現時間亦有不同。如有需要，技術師可能會再約定接下來的造影時間（一般約為注射後2小時，若有需要亦可能隔天）。				
		 				
注意事項		1. 若您有懷孕的可能，可能暫時不宜進行本項檢查，請事先告知我們。 2. 本項檢查前並不需特別的準備，不需禁食。如有前哨淋巴結出現，因會在您的皮膚用筆劃上記號，建議穿著上衣與裙褲分開且易於穿脫的衣服。 3. 造影檢查過程，並不會痛苦，請儘量不動，如此可以提高影像的品質。 4. 本項檢查罕見有過敏等副作用。 5. 本項檢查所用藥物雖具放射性，其半衰期只有6小時且非常微量，基本上不會對您或家人造成傷害，請放心。但為維護兒童與孕婦之權益，注射後24小時內請盡量減少近距離相處（一公尺以內稱近距離）。				
有任何疑問歡迎與核醫科聯絡: 聯絡電話:04-23592525轉4801 Email: nm@vghtc.gov.tw						