臺中榮民總醫院

96年05月18日制定

114年1月22日八修

klorsept 消毒錠使用於病室環境及物品所需濃度及使用方法

使用狀況	需要濃度 (ppm)	稀釋比例	使用方法
空氣、飛沫、接觸隔離病人使用過之壓脈帶。	250 ppm	1 錠/1 公升水	浸泡 1 小時後再清洗、晾乾。
1.標準、空氣、飛沫、接觸隔離病人使用過之儀器。 2.標準、飛沫、接觸隔離病人使用過之物品、環境及地面。 3.環境或地面遭血液、體液、排泄物或分泌物少量噴濺。 4.醫療照護公共區域之物品、環境及地面。 5.空氣隔離病人使用過之物品、環境及地面。 6.諾羅病毒感染病人使用過之物品、環境及地面。	1,000 ppm	2 錠/500 CC 水	擦拭後停留 10 分鐘。 尿壺及便盆：泡消 30 分鐘，再清洗、晾乾。 (適用於 CSR 去污區環境)
1.環境或地面遭血液、體液或排泄物大量傾倒時。 2.物品、環境或地面遭諾羅病毒感染病人之糞便、嘔吐物高度污染時。	5,000 ppm	4 錠/250 CC 水	泡消 30 分鐘，再以布巾或拖把清潔。 擦拭後停留 10 分鐘。
病室物品、環境或地面被庫賈氏症病人的腦脊髓液、中樞神經組織或眼部組織污染時。	20,000 ppm	16 錠/250 CC 水	泡消 60 分鐘後，再用布巾或拖把清潔。

消毒濃度係參考美國疾病管制局及衛生署環境清潔指引

開瓶後請註記開瓶年月日，以瓶身標示之效期作為開封後效期。拿取消毒錠後請立即加蓋，若變成粉狀表示變質，勿再使用。

感染管制中心製表