


		臺 中 榮 民 總 醫 院 Taichung Veterans General Hospital		核子醫學科 衛 教 單	
編號	23 A	名稱	核醫胃-食道逆流掃描 (Enterogastroesophageal Reflux)	修訂日期	2025/01/01
				修訂版次	第11版
主要目的		一、評估胃-食道逆流的情形及嚴重度。 二、評估是否有逆流物吸入肺臟的情形。			
檢查流程		1. 造影檢查前至少 禁食4小時 以上。 2. 核醫科櫃檯報到後，請到叫號機插健保卡抽取號碼牌，並請依照語音指示進行後續檢查流程，先至第4造影室插卡報到，再至休息區等候。 3. 輪到您時，叫號系統會呼叫您的號碼，通知您解小便，再至核醫造影室。 4. 如廁後請至造影室，依放射師指示在造影室喝入約500c. c. 含核醫藥物 (Tc-99m DTPA) 的開水。 5. 先平躺檢查床進行一次胸部造影。 6. 隨後會在您的腹部加壓，再進行一次胸部造影。目的是增加檢查的靈敏度。 7. 造影檢查時，只需靜靜躺著，並不會痛苦。整個檢查約需半小時。 8. 如有評估逆流物吸入肺臟需要時，技術員會再與您約1-2小時之後加做胸部局部造影。			
		 			
注意事項		1. 若您有 懷孕 的可能，可能暫時不宜進行本項檢查， 請事先告知我們 。 2. 建議不要穿戴有金屬物的衣服及配件(如：項鍊)。 3. 建議於檢查結束後多喝水、多上廁所，以促進核醫藥物的排泄。 4. 在造影前先解小便，請注意避免尿液污染到衣褲及皮膚。 5. 造影檢查過程，並不會痛苦，請儘量不動，如此可以提高影像的品質。 6. 本項檢查罕見有過敏等副作用。 7. 本項檢查所用藥物雖具放射性，其半衰期只有6小時且非常微量，基本上並不會對您或家人造成傷害，請放心。但為維護兒童與孕婦之權益，檢查24小時內請盡量減少近距離相處（一公尺以內稱近距離）。			
有任何疑問歡迎與核醫科聯絡： 聯絡電話：04-23592525轉4801 Email：nm@vghtc.gov.tw					