

置放導尿管適應症	
1	需要膀胱灌洗或輸注藥物至病人的膀胱。
2	尿路阻塞(水腎或腎結石)造成急性尿滯留。
3	需要嚴密監測輸入排出量的重症病人。
4	泌尿道、攝護腺或骨盆腔手術病人。
5	尾骶骨或周圍有3或4度壓瘡的失禁病人
6	脊髓受損而留置導尿管病人。
7	其他原因，當科醫師或泌尿科醫師特別要求。 理由：

並“無”上列任一項需續留導尿管的情況者，即由醫師或專科護理師開立移除導尿管醫囑，並移除導尿管。

註：

尿管移除後6小時未自解或解尿困難，使用超音波餘尿測試。

餘尿大於250cc->重新置放尿管。

餘尿小於250cc->成功，繼續觀察解尿狀況。

日期							
可拔							
不可拔/原因第幾項目							
簽名							

王佩琮、林湘玉、林意純、辛文蕙、簡莉盈、林小玲（2017）·依適應症提示移除尿管可降低內科病房導尿管相關尿路感染·護理雜誌，64(1)，70–79。[Wang, P. T., Lin, H. Y., Lin, Y. T., Shin, W. H., Chien, L. Y., & Lin, S. (2017). Using an indicator-based reminder of catheter removal to effectively decrease catheter-associated urinary tract infections in general medical patients. The Journal of Nursing, 64(1), 70–79.] doi:10.6224/JN.000010

Gould, C. V., Umscheid, C. A., Agarwal, R. K., Kuntz, G., & Pegues, D. A. (2010). Guideline for prevention of catheter-associated urinary tract infections 2009. Infection Control and Hospital Epidemiology, 31(4), 319–326. doi:10.1086/651091

Hooton, T. M., Bradley, S. F., Cardenas, D. D., Colgan, R., Geerlings, S. E., Rice, J. C., ... Nicolle, L. E. (2010). Diagnosis, prevention, and treatment of catheter-associated urinary tract infection in adults: 2009 International clinical practice guidelines from the infectious diseases society of America. Clinical Infectious Diseases, 50(5), 625–663. doi:10.1086/650482