

必須放冰箱貯存之藥品安定性

臺中榮總藥學部 2016/12 更新

項次	藥名	治療用途	儲藏溫度	可置於室溫時間
1	Abatacept inj 250mg/vial, 125mg (Orencia®)	類風溼性關節炎、幼年型慢性關節炎	2-8°C	NA
2	Actilyse inj. 50mg (t-PA)	血栓溶解劑	2-8°C	同標示效期 (<30°C) 配製後：24 hr(2-8°C) 8 hr(<30°C)
3	Adacel-TM vaccine inj	四歲以上追加疫苗接種，用以預防白喉、破傷風、百日咳及小兒麻痺	2-8°C	NA
4	Adalimumab inj (Humira®)	中度至重度類風濕性關節炎，乾癱性關節炎、僵直性脊椎炎。	2-8°C	NA
5	Brentuximab vedotin (Adcetris®) inj 50mg	治療復發或頑固型 cd30+何杰金氏淋巴瘤(HL); 治療復發或頑固型全身性退行分化型大細胞淋巴瘤(systemic anaplastic large cell lymphoma ; sALCL)。	2-8°C	配製後 24 小時內使用完畢
6	AdimFlu inj 0.5mL	流行感冒疫苗	2-8°C	NA
7	Advate inj 500IU, 1000IU (Factor VIII inj 500IU, 1000IU)	治療 A 型血友病	2-8°C	有效期限內於 30°C 以下可存放 6 個月，若已移存於室溫後不可再重存於冷藏庫
8	Aflibercept inj 4mg (Eylea®)	治療非息肉狀脈絡膜血管病變(PCV)的血管新生型(溼性)年齡相關性黃斑部退化病變	2-8°C 避光	NA
9	Aflibercept inj 100mg (Zaltrap®)	轉移性大腸直腸癌	2-8°C 避光	NA
10	Agalsidase alfa inj 3.5mg/3.5ml (Replagal®)	法布瑞氏症(Fabry disease)	2-8°C	NA
11	Agalsidase beta inj 35mg (Fabrazyme®)	α-GALACTOSIDASE A 缺乏患者 (即 FABRY DISEASE) 酵素補充治療	2-8°C	NA
12	Alglucosidase inj 50mg (Myozyme®)	治療罕見疾病龐貝氏症(Pompe disease)	2-8°C 避光	NA
13	Amphotericin-B inj. 50 mg/vial (Ambisome®)	抗黴菌	<25°C	配製後：24 小時 (2-8°C)
14	Amphotericin-B inj. 50 mg/vial (Fungizone®)	抗黴菌	2-8°C	在濃度 5 mg/ml： 1 週(2-8°C)、 24 hr(室溫)
15	Anidulafungin inj. 100 mg/vial (Eraxis®)	治療非白血球低下之成人念珠菌血症，念珠菌腹膜炎及念珠菌腹腔內膿瘍。	2-8°C	在不超過 25°C 的溫度 96 小時

必須放冰箱貯存之藥品安定性

臺中榮總藥學部 2016/12 更新

項次	藥 名	治 療 用 途	儲藏溫度	可置於室溫時間
16	Anti-venin(hemo) inj.	抗毒蛇血清(出血性)	2-8°C	NA
17	Anti-venin(neuro) inj.	抗毒蛇血清(神經性)	2-8°C	NA
18	Asparaginase inj 10,000 KU (Leunase®)	急性白血病(包括由慢性白血病轉變成急性者), 惡性淋巴瘤	2-8°C	配製後: 8 小時(室溫)
19	Atosiban inj. 7.5 mg/ml, (Tractocile®) 5 ml/vial	延遲妊娠婦女迫切的早產	2-8°C	一旦開瓶必須立刻使用
20	Atracurium inj. 25 mg/amp (Tracrium®, Genso®)	神經肌肉阻斷劑	2-8°C	一旦離開過冰箱必須在 14 天內用完
21	Bacillus calmette-guerin inj 50mg (Oncotice®)	治療及預防膀胱原發或復發原位癌, 或經尿道切除後之表淺性乳頭瘤(Ta 及 T1)	2-8°C 避光	配製後: 2 小時 (2-8°C, 避光)
22	Basiliximab inj. 20 mg/vial (Simulect®)	單株抗體, 器官移植用藥	2-8°C	運送與儲存皆必須於 2-8°C 狀態下
23	Beclomethasone /Formoterol (Foster®)	適用於需規律使用吸入型皮質類固醇與長效 beta 2-致效劑合併治療的氣喘病患	2-8°C	發藥前: 請儲存於冰箱 (2-8°C) (最長可存放 15 個月)。 發藥後: 請勿儲存於 25°C 以上環境 (最長可存放 5 個月)。
24	Belimumab inj 120mg, 400mg (Benlysta®)	「與標準治療併用, 適用於在標準治療下仍存有高疾病活性的自體免疫抗體陽性的全身性紅斑性狼瘡成年患者。」	2-8°C 避光	NA
25	Bevacizumab inj. 100 mg/4 ml (Avastin®)	一種單株抗體, 用於治療大腸癌	2-8°C	NA
26	Biseko 50 ml/vial	血清蛋白用於低蛋白血症、休克、燒傷	2-8°C	NA
27	Botulinum toxin A inj 1U (Botox®)	Botulinum A toxin	2-8°C	NA
28	Busulfan inj (Busulfex®)	化療藥物	2-8°C	配製後 8 小時內使用完畢
29	Carbetocin inj 100mg (Duratocin®)	預防在硬膜外或脊髓麻醉下剖腹產後子宮收縮乏力	2-8°C 避光	NA
30	Carmustine inj. 100mg/vial	抗癌劑	2-8°C	NA

必須放冰箱貯存之藥品安定性

臺中榮總藥學部 2016/12 更新

項次	藥名	治療用途	儲藏溫度	可置於室溫時間
31	Caspofungin inj 50mg	適用於其他治療方法無效或不能忍受的侵入性麴菌病 (INVASIVE ASPERGILLOSIS) 治療之第二線用藥	2-8°C	配製後 ≤ 25°C : 24hr 稀釋後 ≤ 25°C : 24hr 或 2-8°C : 48hr
32	Cervarix vaccine (人類乳突病毒第16/18型疫苗)	10-25 歲女性人類乳突病毒疫苗預防接種	2-8°C 避光	8-25°C : 3 天 25-37°C : 1 天
33	Cetuximab inj 100 mg/50ml/vial (Erbix [®])	直腸結腸癌	2-8°C	NA
34	Choriogonadotropin alfa (Ovidrel [®])	誘導排卵	2-25°C	30 天 (<25°C)
35	0.25% Chloramphenicol eye drop	眼睛細菌感染	2-8°C	30 天
36	Clostridium botulinum type A INJ (Dysport [®])	小兒腦性麻痺引起之肌肉痙攣、成人中風後之手臂痙攣、眼瞼痙攣、半邊顏面痙攣、痙攣性斜頸、皺眉紋及腋窩多汗症	2-8°C	配製後: 8 小時(2-8°C)
37	Coagulation Factor IX Recombinant (Benefix [®])	適用於控制及預防 B 型血友病	2-8°C	有效期限內於 30°C 以下可存放 6 個月, 若已移存於室溫後不可再重存於冷藏庫 配製後: 3 小時(室溫)
38	Coagulation Factor 9 inj 1,000IU (Rixubis [®])	治療 B 型血友病	2-8°C	調配後 3 小時內給藥完畢
39	Cytomegalo-immunoglobulin 2500u (Cytotect [®])	人類巨細胞病毒免疫球蛋白.	2-8°C	開封後 6 小時內使用, 並於 12 小時內使用完畢
40	Dacarbazine 200mg	抗癌劑	2-8°C	NA
41	Daptomycin inj 500 ng/vial (Cubicin [®])	抗生素	2-8°C	NA
42	Dacarbazine 200mg	化學治療藥	2-8°C 避光	NA
43	Darbepoetin 20 mcg/syringe (NESP [®])	紅血球生成素(DPO, 長效)	2-8°C	NA
44	Denosumab 60mg/ml (Prolia [®])	治療有骨折高風險性之停經後婦女骨質疏鬆症	2-8°C	室溫下 ≤ 25°C, 最多儲存 14 天
45	Denosumab 120mg/ml (Xgeva [®])	實體腫瘤已有骨轉移之成人病患, 預防發生骨骼相關事件	2-8°C	室溫下 ≤ 25°C, 最多儲存 14 天
46	Desmopressin inj. 4 mcg/ml (Minirin [®])	尿崩症或刺激 von Willebrand factor 釋出	2-8°C	NA

必須放冰箱貯存之藥品安定性

臺中榮總藥學部 2016/12 更新

項次	藥名	治療用途	儲藏溫度	可置於室溫時間
47	Dinoprostone vaginal tab.	妊娠末期之陣痛誘發及促進	2-8°C	NA
48	Docetaxel inj 20mg, 80mg (Taxotere®)	抗癌劑	2-8°C	NA
49	Docetaxel inj 20mg , 80mg (Tynen®)	化學治療藥	2-8°C 避光	輸注溶液應在室溫 4 小時內使用
50	Doxorubicin inj 20mg (Lipo-dox®)	化學治療藥	2-8°C	用 Dextrose 5% in water 稀釋後應立即使用或儲存在 2-8°C 不超過 24 小時
51	Dulaglutide inj 1.5mg (Trulicity®)	第 2 型糖尿病	2-8°C 避光	室溫下 ≤ 30°C，最多儲存 14 天
52	Elaprase inj 6mg (Idursulfase)	治療韓特氏症(黏多醣症第二型，MPS II)	2-8°C 避光 不要搖晃	稀釋後 2-8°C 最多存放 24 小時
53	Elonva inj 150mcg (Corifollitropin alfa)	在婦女接受人工協助生殖技術計劃時，本品與性腺刺激素釋放激素拮抗劑 (GnRH antagonist) 併用，使用於控制下刺激卵巢，以誘導多個濾泡發育。	2-8°C 避光	為方便使用起見，患者可將 Elonva 存放 25°C 或(含)以下的溫度，但不可超過 1 個月。
54	Encephalitis Japan (JAPANESE ENCEPHALITIS VAC.)	日本腦炎疫苗	2-8°C	NA
55	Engerix-B vaccine 20mcg/ml	B 肝疫苗	2-8°C	NA
56	Epirubicin inj.20mg	化學治療藥	2-8°C 避光	NA
57	Epoetin 5000 U/syringe (Recormon®)	紅血球生成素 EPO	2-8°C	3 天 (<25°C)
58	Eribulin mesylate inj 1mg (Halaven®)	治療轉移性乳癌	<25°C	稀釋後：4 小時(室溫)、24 小時(冷藏)
59	Etanercept inj 25 mg, 50mg (Enbrel®)	類風濕性關節炎	2-8°C	NA
60	Exenatide inj 2 mg (Bydureon®)	Type 2 DM	2-8°C 避光	若置於 25°C 以下，不得超過 4 週
61	Feiba inj 500IU, 1000IU (Factor VIII Inhibitor Bypassing Activity inj. 500U/vial)	治療及預防有第八因子抗體之 A 型血友病患者出血，治療及預防有第九因子抗體之 B 型血友病患者出血，治療及預防有第八、十一、十二因子後天性抗體之非血友病患者出血	2-8°C	6 個月 (<25°C)

必須放冰箱貯存之藥品安定性

臺中榮總藥學部 2016/12 更新

項次	藥名	治療用途	儲藏溫度	可置於室溫時間
62	Florinef tab 0.1mg	愛迪生氏病與腎上腺增殖，姿態性低血壓	2-8°C	NA
63	Follitropin alfa inj 75 IU/ampl (Pergoveris®)	治療不孕症	<25°C	同效期標示
64	Follitropin beta inj 300 IU/vial (Puregon®)	治療不孕症	2-8°C	3 個月 (<25°C)
65	Fosaprepitant inj 150mg (Emend®)	防止癌症化療藥物引起之急性或延遲性噁心與嘔吐	2-8°C	配置及稀釋後可於冷藏或室溫 24 小時
66	Fulvestrant inj. 250mg/vial (Faslodex®)	治療已接受輔助性抗雌激素療法但疾病仍復發，或使用抗雌激素療法但疾病仍惡化的停經婦女，且其雌激素受體為陽性的局部晚期或轉移性乳癌。	2-8°C	NA
67	Gardasil 4*HP Vaccine 0.5mL (人類乳突病毒第 6、11、16、18 型)	9-26 歲女性人類乳突病毒疫苗預防接種	2-8°C	NA
68	Gemcitabine inj 200mg (GeMMis®)	1. 非小細胞肺癌 2. 胰臟癌 3. 膀胱癌 4. Gemcitabine 與 paclitaxel 併用，可使用於曾經使用過 anthracycline 之局部復發且無法手術切除或轉移性之乳癌患者。5. 用於曾經使用含鉑類藥物 (PLATINUMBASED) 治療後復發且間隔至少 6 個月之卵巢癌，作為第二線治療。	2-8°C	NA
69	Genotropin 16 IU inj. (Somatropin)	生長激素	2-8°C	1 個月 (<25°C)
70	Glatiramer inj (Copaxone®)	復發型多發性硬化症	2-8°C	15-25°C 最多 7 天
71	Glucagon inj. 1mg	治療低血糖症	2-8°C	NA
72	Golimumab 50mg (Simponi®)	適用於治療中至重度活動性類風濕性關節炎成人患者	2-8°C	NA
73	Gonal-F inj 300IU	基因工程製造的濾泡刺激素	2-8°C	開始使用後，<25°C 下可貯存 28 天
74	Haemate-P inj 250u	第八凝血因子	2-8°C	配成溶液後 4 小時內用完
75	HCG 5000U/vial (Forstrong®)	排卵激素	2-15°C 避光	同標示效期

必須放冰箱貯存之藥品安定性

臺中榮總藥學部 2016/12 更新

項次	藥名	治療用途	儲藏溫度	可置於室溫時間
76	Hepatect inj 500 IU/vial	B 肝免疫球蛋白(IV 使用)	2-8°C	NA
77	Hepatitis A vaccine (Havrix® 720 Junior)	A 型肝炎疫苗	2-8°C	NA
78	Hepatitis A vaccine (Vaqta® Vaccine inj)	預防 A 型肝炎疫苗	2-8°C	NA
79	Hepatitis B immunoglobulin (H.B.I.G, Hyper-Hep)	B 肝免疫球蛋白(for IM 使用)	2-8°C	NA
80	Humalog KwikPen-25, 50 inj 100 IU/ml, 3 ml/pen	胰島素	2-8°C	28 天 (<30°C)
81	Humatrope inj. 5mg	生長激素	2-8°C	以提供之稀釋劑或制菌注射用水配製, 儲存於 2-8°C 的冰箱中, 可維持穩定至 14 天。
82	Humatrope inj. 12mg	生長激素	2-8°C	只能以提供的稀釋劑針筒配置, 稀釋後 2-8°C 冰箱儲存, 可穩定保存 28 天, 儲存時注射筆應取下針頭
83	Humulin N7/R3 10ml	胰島素	2-8°C	28 天 (<30°C)
84	HyperRHO inj.	Rho(D) Immune Globulin	2-8°C	NA
85	Immunoglobulin inj 3.0 gm/vial	免疫球蛋白	2-8°C	NA
86	Insulatard HM 10ml	胰島素	2-8°C	開封後 28 天
87	Insulin Detemir (Levemir FlexPen)	胰島素	2-8°C	開封後 6 週
88	Kogenate inj 250IU, 500IU & 1000IU (Factor VIII)	治療血友病 A 型	2-8°C 避光	配製後: 3 小時內用完 (不可放回冷藏)
89	Lanreotide acetate inj 120mg (Somatuline®)	肢端肥大症	2-8°C	NA
90	Lantus soloStar 300U/注射筆	胰島素	2-8°C	4 週 (<25°C)
91	Leucovorin inj 50mg	大劑量 Methotrexate 之解毒劑	2-8°C 避光	NA
92	Leuprorelin acetate inj 22.5mg (Eligard®)	賀爾蒙治療劑	2-8°C	配製後須立即使用

必須放冰箱貯存之藥品安定性

臺中榮總藥學部 2016/12 更新

項次	藥名	治療用途	儲藏溫度	可置於室溫時間
93	Levosimendan inj 12.5mg (Simdax®)	短期治療因傳統治療方式無效且適用強心劑治療之急性失代償性慢性心衰竭	2-8°C	稀釋後在冷藏或室溫下可存放 24 小時
94	Liraglutide inj 18mg/3ml (Victoza®)	第 2 型糖尿病	2-8°C	第一次使用後 30°C 以下可存放 30 天
95	Lorazepam inj. 2mg/ml (ANxicam®)	鎮靜劑	2-8°C	NA
96	Lyo-PoviGENT inj	綜合維他命	2-8°C 避光	NA
97	M.M.R.II Vaccine INJ	麻疹腮腺炎德國麻疹疫苗	2-8°C	NA
98	Menopur inj (FSH 75IU+LH 75IU)	男女不孕症	< 25°C 避光	配製後應立即使用
99	Minirin 10 mcg/puff (鼻噴劑)	治療尿崩症	<25°C	同標示效期
100	Mircera 100mcg/syringe	紅血球生成素(EPO)	2-8°C	30 天內(<25°C)
101	Mitomycin oph drop	眼藥水(抗癌劑)	2-8°C	NA
102	MoProbi-LR Cap (Lactobacillus rhamnosus)	緩解輕度腹瀉、腹痛及便秘	2-8°C 避光	NA
103	NaCl eye drop 3%	眼藥水	2-8°C	14 天
104	Natamycin oph drop	眼藥水	2-8°C	同標示效期 (<25°C)
105	Nivolumab inj 20mg, 100mg (Opdivo®)	標靶治療劑	2-8°C 避光	稀釋後(含輸注時間)：4 小時(室溫)、24 小時(冷藏)
106	Normosang inj 250mg (Heme arginate)	紫質症	2-8°C 避光	稀釋後 1 小時內用完
107	NovoMix 30 FlexPen 100U/ML 3ML	胰島素	2-8°C	開封後 4 週
108	NovoRapid FlexPen 100U/mL 3mL	胰島素	2-8°C	開封後 4 週
109	NovoSeven RT INJ 1MG (Factor VII)	A 型及 B 型血友病發生抗第八及第九因子抗體者、缺乏第七因子者	2-25°C 避光	配製後： 6 小時 (<25°C) 24 小時 (2-8°C)
110	Omalizumab (Xolair®)	單株抗體，治療過敏性氣喘	2-8°C	配製後： 8 小時 (2-8°C) 4 小時 (室溫)

必須放冰箱貯存之藥品安定性

臺中榮總藥學部 2016/12 更新

項次	藥名	治療用途	儲藏溫度	可置於室溫時間
111	Palivizumab inj-50 (Synagis®)	預防高危險群之幼兒呼吸道融合細胞病毒感染	2-8°C	配製後 6 小時內使用
112	Panitumumab inj 100mg (Vectibix®)	標靶治療劑	2-8°C 避光	稀釋後：24 小時內 (2-8°C)
113	Pegasys 180 mcg/syringe (Interferon α-2a)	干擾素(治療 B 肝及 C 肝)	2-8°C	NA
114	Pegfilgrastim inj 60mg/0.6ml (Neulasta®)	嗜中性白血球減少症	2-8°C	可置於室溫 48 小時，超過則須丟棄。
115	Peg-Intron 100mcg/vial (Interferon α-2b)	干擾素(治療 C 肝)	2-8°C	NA
116	Pembrolizumab inj 50mg (Keytruda®)	標靶治療劑	2-8°C	配置及稀釋後(含輸注時間)：6 小時(室溫)、24 小時(2-8°C)
117	Pentaxim inj (DTaP-Hib-IPV VACCINE)	五合一疫苗	2-8°C	NA
118	Pertuzumab inj 420mg (Perjeta®)	用於治療 HER2 陽性的晚期(轉移性)乳腺癌的患者	2-8°C 避光	若稀釋後的輸注溶液未立即使用，在 2°C-8°C 下最多可存放 24 小時
119	Pneumococcal-23 vaccine 0.5ml	肺炎球菌疫苗	2-8°C	NA
120	PPD inj 15d/1.5mL	試驗結核菌素反應	2-8°C 避光	NA
121	Prevenar inj-13	預防 2 個月至 5 歲大嬰幼兒、50 歲以上成人，血清型肺炎球菌所引起的侵入性疾病。	2-8°C	NA
122	Ramucirumab inj 100mg, 500mg (Cyramza®)	治療晚期或轉移性胃腺癌	2-8°C 避光	稀釋後： 4 小時(<25°C)、 24 小時(2-8°C)
123	Ranibizumab inj 2.3mg (Lucentis®)	適用於治療血管新生型(濕性)年齡相關性黃斑部退化病變	2-8°C	NA
124	Rasburicase 1.5mg (Fasturtec®)	治療及預防血癌患者之急性高尿酸血症	2-8°C	配製或稀釋後：24 小時(2-8°C)
125	Rebif inj 44mcg (Interferon beta-1a)	多發性硬化症	2-8°C 避光	NA
126	rhG-CSF inj 300 mcg & 75 mcg	嗜中性白血球增生劑	2-8°C	24 小時
127	Risperdal Consta inj 25 & 37.5 mg/vial	治療精神分裂症	2-8°C	7 天(<25°C)

必須放冰箱貯存之藥品安定性

臺中榮總藥學部 2016/12 更新

項次	藥名	治療用途	儲藏溫度	可置於室溫時間
128	Rinderon –A oph solution 0.1% 5 ml	類固醇眼藥水	2-8°C	NA
129	Rituximab 100 & 500mg	單株抗體，治療	2-8°C	NA
130	Roferon A inj 3MU (Interferon alfa-2a)	干擾素	2-8°C	NA
131	Rotavirus vaccine (Rotarix [®] , Rotateq [®])	口服活性輪狀病毒疫苗	2-8°C	運送與儲存皆必須於 2-8°C 狀態下
132	Sandostatin inj. 0.1mg	預防胰臟術後併發症，治療胃食道靜脈曲張出血	2-8°C	2 週(<30°C)
133	Sandostatin LAR-20 & 30mg	肢端肥大症、功能性胃、腸、胰內分泌腫瘤	2-8°C	在注射日當天可置於 25°C 以下環境
134	Saizen inj 8mg	小孩生長激素缺乏	2-8°C	NA
135	Secukinumab inj 150mg (Cosentyx [®])	治療全身性中至重度斑塊性乾癬	2-8°C 避光	調配後：24 小時 (2-8°C)
136	Somatropin inj 5mg/1.5ml (Omnitrope [®])	生長激素	2-8°C 避光	第一次使用後需存放 2-8°C 不可超過 28 天，且需避光。
137	Survanta susp. 200 mg/8ml	治療新生兒呼吸窘迫症 (RDS)	2-8°C	NA
138	Temsirolimus inj 25mg (Torisel [®])	晚期腎細胞癌	2-8°C 避光	配製後：24 hr (10mg/ml) 以 NS 稀釋後：6 小時 內給藥完畢
139	Teriparatide inj (Forteo [®])	治療骨質疏鬆	2-8°C	應隨時儲存於 2-8°C
140	Tetanus immune globulin inj 250U	預防破傷風	2-8°C	NA
141	Tetanus Toxoid 1ml/vial	破傷風類毒素	2-10°C	NA
142	Thymoglobulin inj. 25 mg	抗胸腺細胞免疫球蛋白	2-8°C	NA
143	Tocilizumab 200mg, 80mg (Actemra [®])	與 MTX 併用治療中至重度活動性類風濕性關節炎	2-8°C	NA
144	Trastuzumab inj. 440 mg (Herceptin [®])	單株抗體，治療轉移性乳癌	2-8°C	NA
145	Trastuzumab emtansine inj 100mg (Kadcyla [®])	單株抗體，治療轉移性乳癌	2-8°C	配製後放冰箱內 (2-8°C)最多 24 小時

必須放冰箱貯存之藥品安定性

臺中榮總藥學部 2016/12 更新

項次	藥名	治療用途	儲藏溫度	可置於室溫時間
146	Trientine 300mg	銅離子螯合劑	2-8°C	NA
147	Triptorelin inj 3.75mg (Decapeptyl [®] CR)	中樞性早熟、攝護腺癌之輔助治療，子宮內膜異位症，子宮肌瘤切除手術前縮減子宮肌瘤體積之輔助治療，女性不孕症在體外受精及胚胎植入(IVF-ET)之輔助治療	2-8°C	NA
148	Triptorelin inj (Decapeptyl [®])	女性不孕症在體外受精及胚胎植入之輔助治療	2-8°C 避光	NA
149	Ustekinumab inj 45mg/0.5ml (Stelara [®])	適用於治療適合接受光療法或全身性治療的中至重度斑塊性乾癬成人患者(18歲(含)以上)。	2-8°C	NA
150	Varilrix vac. inj	水痘疫苗	2-8°C 避光	NA
151	Varivax vaccine 0.5 ml inj	水痘疫苗	2-8°C 避光	NA
152	Vaxigrip vaccine 0.25 ml & 0.5 ml inj	流感疫苗	2-8°C	NA
153	Verorab vaccine inj (Rabies vaccine)	狂犬病疫苗	2-8°C	NA
154	VinBlastine 10mg	抗癌劑	2-8°C	NA
155	Vincristine inj. 1 mg	抗癌劑	2-8°C	NA
156	Vinorelbine inj 10 mg & 50 mg	非小細胞肺癌 轉移性乳癌	2-8°C	24 小時 (<25°C)
157	Vinorelbine 20 mg & 30 mg cap (Navelbine [®])	非小細胞肺癌 轉移性乳癌	2-8°C	NA
158	Xalatan oph 2.5 ml/bot	治療青光眼眼藥水	2-8°C	4 週 (<25°C)
159	Zostavax vaccine inj (Zoster [®])	預防 50~79 歲之成人帶狀疱疹	2-8°C 避光	NA；配製後的疫苗若應在 30 分鐘內使用

參考來源:

1. Micromedex Healthcare Series
2. Lexicomp Online
3. 藥物仿單

附註: 1. NA: no data available. 2. 可置於室溫時間屬 NA 者，若為首日劑量時，請護理站派專人領取；屬單一劑量藥車給藥時則隨藥車配送並請護理站點收後立即放入冰箱保存。3. 藍色字為此版新增部份