



編號

13

名稱

核醫副甲狀腺掃描
(Parathyroid Scan)

修訂日期

2025/01/01

修訂版次

第12版

主要目的

- 一、副甲狀腺腺瘤及增生之定位偵測。
- 二、異位副甲狀腺之定位偵測。

檢查流程

1. 核醫科櫃檯報到後，請到叫號機插健保卡抽取號碼牌，並請依照語音指示進行後續檢查流程，先至注射室插卡報到，再至休息區等候。
2. 輪到您時，叫號系統會呼叫您的號碼，先至注射室靜脈注射藥物：鎳-99m MIBI。
3. 至第4造影室報到機插卡報到，請再回休息區等候。
4. 輪到您時，叫號系統會呼叫您的號碼，並通知您先解小便。
5. 如廁後請至造影室，造影前請主動告知頸部或手部有無開刀病史。依技術師指示平躺於檢查床，造影檢查時，只需靜靜平躺於檢查床，並不會痛苦。掃描時間約20分鐘。
6. 第一次掃描結束，放射師會與您約定第二次造影的時間(大約2小時後)。
7. 依約定時間回到本科，至第4造影室報到機插卡報到，請再回休息區等候。
8. 如廁後請至造影室，一樣平躺於檢查床接受平面掃描。掃描時間約20分鐘。
9. 若有需要，會進行單光子斷層掃描(360度掃描)，掃描時間約30分鐘。



注意事項

1. 若您有懷孕的可能，可能暫時不宜進行本項檢查，請事先告知我們。
2. 本項檢查前並不需特別的準備，不需禁食。
3. 建議不要穿戴有金屬物的衣服及配件(如：項鍊)。
4. 建議於注射後多喝水、多上廁所，以促進核醫藥物的排泄。
5. 在造影前先解小便，請注意避免尿液污染到衣褲及皮膚。
6. 造影檢查過程，並不會痛苦，請盡量不動，如此可以提高影像的品質。
7. 本項檢查罕見有過敏等副作用。
8. 本項檢查所用藥物雖具放射性，其半衰期只有6小時且非常微量，基本上並不會對您或家人造成傷害，請放心。但為維護兒童與孕婦之權益，注射24小時內請盡量減少近距離相處(一公尺以內稱近距離)。

有任何疑問歡迎與核醫科聯絡：

聯絡電話：04-23592525轉4801

Email：nm@vghtc.gov.tw

