

小兒特殊配方

	益富糖飴用量 (公克/c.c.)	益富麥格拉用量 (公克/c.c.)	kcal/cc
第一階段	0.035	-----	+0.1
第二階段	0.062	-----	+0.2
第三階段	0.035	0.041	+0.3
第四階段	-----	0.081	
第五階段	-----	0.091	
第六階段	-----	0.109	
第七階段	-----	0.126	
第八階段	0.035	0.126	

1. 沖調方法:每一瓶奶

- ➡ 依所喝的奶量計算出糖飴及麥格拉的量並秤重
- ➡ 將寶寶所喝的奶量沖好後加入所秤量的糖飴及麥格拉搖勻即可

2. 第一階段到第二階段和第二階段到第三階段可以每隔一天就進階；第三階段到第八階段每隔三天進一階段；到第八階段後就持續使用。

3. 出院前:益富糖飴、益富麥格拉、上皿天平(100 公克)可至本院第一醫療大樓二樓維康醫療用品中心選購。

4. 請務必確實依建議量秤重否則易有腹脹、腹瀉等症狀產生。

5. 如果您的寶寶為限水型的心臟病，請和醫護人員聯絡其一天的水份限制量。

6. 有限水的寶寶請家長留意一天總水份是否全量攝取，否則寶寶易患便秘。

7. 如遇任何有關飲食方面問題，請洽

Tel: 04-23592525~

04-23592525~2620

營養師