

## Zoladex 特點



停經狀態為「可逆性」的，大部分人停止使用半年至一年月經會恢復（若趨於停經年齡，則自然停經）



提供想生育的女性仍有機會保留卵巢功能



對荷爾蒙接受器呈陽性（ER+，PR+）其具有相當於化療（CMF）的療效



不必忍受掉髮、嘔吐、噁心和倦怠等化療副作用



可避免其他抗荷爾蒙製劑所造成子宮內膜異常增厚、深部靜脈栓塞等副作用

## 荷爾蒙治療的方式

### 有那麼多種

### 我該怎麼選擇？

現在醫療科技進步，停經前乳癌治療方式不斷推陳出新，記得定期回診追蹤，並與醫師溝通自己的考量，做出最適合自己的醫療選擇



Zoladex®  
goserelin

AstraZeneca

# 停經前 荷爾蒙受體 陽性乳癌

諾雷德持續性皮下注射劑



AstraZeneca

臺灣阿斯特捷利康股份有限公司  
台北市敦化南路二段 207 號 21 樓  
電話：(02)2378-2390 <http://www.astrazeneca.com.tw>  
TW-28355\_ZOL\_10/04/2024

【本用藥指導手冊無法取代專業醫療判斷，僅供專業醫護人員衛教病人使用。如有疾病或藥物使用的相關問題，請諮詢您的醫療專業人員。】

## 哪些患者適合使用Zoladex呢？

- 停經前  
尤其是年輕、未婚、欲生育的乳癌患者
- 屬於荷爾蒙受體陽性乳癌
- 早期乳癌，手術後之輔助治療
- 發生癌細胞轉移之乳癌
- 接受化療後仍未停經的乳癌患者



## Zoladex是如何作用呢？

### 諾雷德持續性皮下注射劑



類似人體下視丘所分泌的  
促性腺激素釋放激素 (GnRH,  
Gonadotropin-releasing hormone)



長期影響腦下垂體的GnRH受體  
後，抑制腦下垂體分泌LH、FSH  
進而抑制卵巢分泌雌激素，使雌  
激素的血中濃度持續的抑制在相  
當於停經後的濃度




癌細胞無法繼續生長




## Zoladex使用方法

- 1 **Zoladex** 是透過皮下注射方式給藥，  
專業醫護人員會於患者前腹壁給藥



- 2 患者在最初給藥後21天左右，血中雌激素即受到抑制，並在隨後每4週或每12週注射一次的連續治療中，將雌激素濃度持續的抑制在相當於停經後的濃度



## Zoladex常見副作用(發生機率)



性慾減退、  
熱潮紅、多汗症(≥10%)  
這些藥理作用很少需要停止  
Zoladex 治療



皮疹(1~10%)  
通常是輕微的皮疹，往往不需  
要停藥即可復原



血壓異常(1~10%)  
可能為低血壓或高血壓，偶爾  
見於使用 Zoladex 的患者。血  
壓異常通常是暫時性的，不論  
繼續以 Zoladex 治療或停藥後  
皆可解除。這種狀況極少需要  
醫療的介入，也很少需要停止  
Zoladex 治療

若您在使用藥品期間發現有上述症狀或是其他令您不舒服的症狀，請告知您的醫師或藥師

完整不良反應說明及其他注意事項，請參閱衛生福利部核准仿單說明書