

			臺 中 榮 民 總 醫 院 Taichung Veterans General Hospital		核子醫學科 衛 教 單		
編 號	31	名 稱	核醫腦室腹腔分流管暢通掃描 (V-P Shunt Patency Scan)			修訂日期	2025/01/01
						修訂版次	第11版
主要目的		評估腦室腹腔分流管是否暢通。					
檢查流程		1. 此項檢查須先簽立檢查同意書。 2. 核醫科櫃檯報到後，請到叫號機插健保卡抽取號碼牌，並請依照語音指示進行後續檢查流程，先至第4造影室插卡報到，再至休息區等候。 3. 輪到您時，叫號系統會呼叫您的號碼，通知您解小便，再至核醫造影室。 4. 如廁後請至造影室，依放射師指示平躺於檢查床上。醫師會對頭部注射處進行局部毛髮剃除，無菌消毒後，經由腦室腹膜腔分流管的頭部球囊內，注射核醫藥物：Tc-99m DTPA。 5. 注射藥物後，立即、15分各進行造影一次，每次造影時間約5分鐘。造影檢查時，只需靜靜躺著，並不會痛苦。 6. 因個人分流管暢通程度的不同，可能需要加照注射藥物後30分鐘、45分、60分鐘或90分鐘的影像，放射師會與您約定時間必要時會請您起身走動或按摩肚子。					
							
注意事項		1. 若您有懷孕的可能，可能暫時不宜進行此項檢查，請務必先告知我們。 2. 此項檢查的核醫藥物可能會進入腦脊髓腔中，嚴重後遺症的可能性雖然不高，但並不能完全排除，故檢查前須先簽立同意書。 3. 檢查前不需禁食，但檢查前以輕食為主，勿吃過多食物。 4. 造影檢查過程，並不會痛苦，請儘量不動，如此可以提高影像的品質。 5. 本項檢查罕見有過敏等副作用。 6. 本項檢查所用藥物雖具放射性，其半衰期只有6小時且非常微量，基本上並不會對您或家人造成傷害，請放心。但為維護兒童與孕婦之權益，注射後24小時內請盡量減少近距離相處（一公尺以內稱近距離）。					
有任何疑問歡迎與核醫科聯絡： 聯絡電話：04-23592525轉4801 Email：nm@vghtc.gov.tw							