



臺中榮民總醫院
Taichung Veterans General Hospital

核子醫學科
衛 教 單

編號

44
A

名稱

核醫餘尿及尿路逆流檢查 (Scan of Residual Urine, UV-Reflux)

修訂日期

2025/01/01

修訂版次

第9版

主要目的

- 一、評估是否有尿路逆流。
- 二、評估解尿後膀胱的餘尿量等等。

檢查流程

1. 櫃檯報到後，會先請您放置導尿管（嬰幼兒請至小兒科，若有需要帶路或其他協助，請讓我們知道，另本科亦備有輪椅可供您使用。）。
2. 回來後至注射室報到機插健保卡報到，並於等候區等候叫號。輪到您施加核醫藥物時，叫號系統會呼叫您的號碼，再至注射室。一開始會接點滴至導尿管，將核醫藥物經由點滴輸液套管加入膀胱中。
3. 點滴不滴時即表膀胱已充滿，此時請至第四造影室插健保卡報到，等叫號系統呼叫號碼後，進入造影室檢查。造影時讓受檢者躺至檢查台上，開始造影。造影檢查時，只需靜靜躺著，並不會痛苦。
4. 第一次造影結束後，請受檢者解尿後再度進行造影。
5. 整個造影約需時30分鐘（依受檢者的配合度不等）。



注意事項

1. 本檢查不需禁食。
2. 接受核醫餘尿及尿路逆流檢查時，衣物可能會被尿液污染，請多準備一套衣物及尿片。
3. 因放置導尿管的緣故，少數受檢者會有些微血尿的現象，此情形會漸漸改善，若2日後仍持續或是出血量大，請諮詢您的醫師。
4. 本檢查所用藥物雖具放射性，其半衰期只有6小時且非常微量，基本上並不會對您或家人造成傷害，請放心。但為維護兒童與孕婦之權益，注射後24小時內請盡量減少近距離相處（一公尺以內稱近距離）。
5. 其他則無特別之注意事項，並且罕見有過敏等副作用。

有任何疑問歡迎與核醫科聯絡：

聯絡電話：04-23592525轉4801 Email：nm@vghtc.gov.tw