

B 型肝炎疫苗

接種條件:

- * 體重達 2000gm
- * 黃疸值 <15mg/dl
- * 達以上條件後，儘快施打(24 小時內)

作業流程:

1. 開立臨時醫囑 HBV vaccination (備註 *1 第一劑)
2. 注射於大腿中段外側 (IM)

BCG 疫苗

接種條件:

- * 體重達 2500gm
- * SCID 檢測為陰性 (若家屬有自費篩檢)

作業流程: (每星期四施打)

1. 開立臨時醫囑 BCG vaccination
2. 注射於左上臂皮下 (SC)

HBIG 免疫球蛋白接種 (出生後 24 小時內盡快接種)

接種條件:

1. 健保給付
 - (1) 條件: 產單上登錄孕婦 B 型肝炎檢查 *HBsAg* 及 *HBeAg* 均為 positive
 - (2) 流程: 開立臨時醫囑 HBIG，持孕婦 B 型肝炎產前檢查登錄表向嬰兒室領取
 - (3) IM 施打於大腿中外側
2. 自費給付
 - (1) 條件: 產單上登錄孕婦 B 型肝炎檢查 *HBeAg* 為 negative 且 *HBsAg* 效價 ≤ 2560 ，或急產之孕婦未作 B 型肝炎檢查，家屬要求自費給予
 - (2) 流程: 開立藥物醫囑 HBIG(註: 自費)，至藥局領藥
 - (3) IM 施打於大腿中外側

B 肝疫苗與免疫球蛋白接種注意事項：

(一) 體重低於 2000 公克之嬰兒，媽媽為高傳染性 B 型肝炎帶原者

1. 經醫師評估臨床狀況穩定後，於出生後儘速接種 1 劑 HBIG 及 B 肝疫苗，越早越好，同時不要晚於 24 小時。
2. 另於體重滿 2000 公克或在出生滿一個月後，仍需依時程接種 3 劑 B 肝疫苗 (出生接種劑次不列入計算)
3. 若出生體重小於 600 公克者，其 HBIG 於出生後能儘速接種。而第一劑 B 肝疫苗，建議於臨床狀況穩定且生命安全無疑慮時再接種

(二) 媽媽為非高傳染性 B 型肝炎帶原者

1. B 型肝炎疫苗接種時程仍維持於出生 24 小時內儘速接種第 1 劑 B 肝疫苗，於出生滿 1、6 個月接種第 2、3 劑。
2. 若出生體重未滿 2000 公克者，其第一劑 B 肝疫苗，則延後至出生一個月後或體重超過 2000 公克再接種