

## 管灌飲食(Tube Feeding)

一般灌食	治療性灌食		
聚合配方 Polymeric Formula	營養成分調整 聚合配方 Polymeric Formula	元素處方/預解配方 (Elemental Formula/Partially Hydrolyzed Formula)	免疫調節管灌食 (Immune-modulating Formula)
依醫囑處方配製 護理人員可點選	依醫囑處方配製 由醫師點選		
<p>◆腸胃道功能正常,但無法經口進食或無法經口攝取足夠量的營養素時,可使用一般配方飲食。</p>	<p>◆腸胃道功能正常,但無法經口進食或無法經口攝取足夠量的營養素時,可使用聚合配方飲食。</p>	<p>◆腸胃道消化、吸收障礙者,如:短腸症、胰臟炎,可適用已經部份水解或經水解處理之元素飲食(俗稱太空飲食)。</p>	<p>1.本項適用症如下,且使用至全身發炎徵候群消失,即行停止。</p> <p>(1) 嚴重敗血症:臨床上懷疑或證實有感染,加上符合至少二項SIRS(全身性發炎反應徵候群)條件,及臨床上併有至少一個器官衰竭。</p> <p>(2) 急性肺損傷: PaO<sub>2</sub>/Fi O<sub>2</sub>&lt;300 mmHg</p> <p>(3) 急性呼吸窘迫症: PaO<sub>2</sub>/Fi O<sub>2</sub>&lt;200 mmHg</p>
<p>◆供應濃度:1cc 含 1 大卡。</p> <p>◆濃度、熱量與營養成份需調整者,請選擇「營養成分調整配方灌食」。</p> <p>◆1000 大卡(含)以上供應罐裝配方。</p>	<p>◆配方種類:高蛋白質、低蛋白、低糖、低磷、低鉀、低渣、無油等。</p> <p>◆可依病人需要調整濃度,惟不可大於 2 大卡/cc。</p> <p>◆以罐裝或杯裝供應。</p>	<p>◆初始熱量建議小於 1000 大卡開始。</p> <p>◆初始濃度建議不大於 1 大卡/cc,可由 0.5 大卡/cc 開始,再逐漸增至 1 大卡/cc</p> <p>◆以杯裝供應。</p>	<p>◆初始熱量建議小於 1000 大卡開始。</p> <p>◆以杯裝或罐裝供應。</p>
<p>◆處方方式:限放置灌食管或造瘻管之病人使用。</p> <p>◆為健保給付項,若做為口服補充品,不符合健保給付條件,需自費。</p>			