

## 台中榮總神奇之友 2017/4/23 活動成果

活動由惠康基金會贊助部份經費，於台中榮總研究大樓 2 樓第三會場舉行。

神經內科董欣醫師介紹癲癇基本觀念，並播放學會製作之影片，使與會者能夠正確理性面對不再害怕此疾病。

神經內科謝福源主任為大家講解癲癇治療及藥物新知。佐能安之禁忌症是對磺胺類藥物過敏。不建議有嚴重肝功能不全的患者使用。有急性腎衰竭的患者或觀察到血清肌酸酐有臨床上顯著且持續升高時應停止服用。

癲控達不建議中度至重度功能不全或正在接受血液透析之患者使用。輕度肝功能不全患者劑量不可超過 6 mg/天。中度肝功能不全患者之劑量不可超過 4 mg/天。不建議重度肝功能不全患者使用。癲控達含有乳糖，因此若患有半乳糖不耐症、Lapp 乳糖酵素缺乏症或葡萄糖-半乳糖吸收不良等罕見遺傳性疾病之患者不可服用本品。

癲控達有增加跌倒發生之風險，尤其是老年人。有攻擊行為之案例報告。

維帕特適應症為十六歲以上有或無次發性全身發作的局部癲癇發作患者的單一藥物或輔助治療。禁忌症是 2 級或 3 級房室阻斷。對有重度腎功能不全( $CLCR \leq 30$  毫升/分鐘)和終末期腎病患者，建議維帕特最大劑量不得超過 300 毫克/天。需要接受血液透析的患者，在血液透析結束後可直接補充劑量，直到至每日每次劑量的 50%。

謝福源主任再次提醒患者，過去曾有癲癇病患因承受不住電視強烈的聲光刺激，導致發作，現在連手遊也能了危險因子。一名男子有癲癇病史，停藥 2 年未曾發作，但近日卻再度發作，醫師問診時，他坦承自己最近迷上「精靈寶可夢」遊戲，半夜不睡狂抓寶，但還沒抓到 10 隻就發作。

座談會時與會者踴躍發問及分享經驗，彼此學習鼓勵，場面熱

絡。

