


# 臺中榮民總醫院 尖銳物扎傷和血體液暴觸後處理流程


115.02.06修正



3. 詳查病人抗原及抗體  
HIV Ag/Ab Combo test、anti-HBc、HBsAg、anti-HCV、Treponemal Ab (CIA)、RPR  
以上各項若有不明者，應立即抽病人血液檢查  
(請醫師開立病人「針扎抽血套餐」，並在病人病歷上註明needle trauma)

4. 向主管單位報備並進行「針頭和銳物扎傷事件」或「血液和體液暴觸事件」網路通報

5. 工作人員至下列診間抽血檢查(不需掛號)  
上班時間：早上請至感染科門診  
下午請至家醫科門診  
非上班時間請至急診



附註一：若醫療人員未進行通報，病人報告將無法於24小時內檢出。

附註二：污染源不明，視同陽性處理，觀察期間避免性行為或捐血。

附註三：住院病人請當科醫師自『針扎抽血套餐』開立抽血單；門診及已離院病人請被扎醫療人員帶至感染科或家醫科門診，請醫師以『非診間醫師作業--扎傷通報作業』開立抽血單(免費)。

附註四：病人HIV(+)時：上班時間掛感染科門診依一般看診流程開藥；非上班時間，針扎同仁自行呼叫感染科值班總醫師評估之後，醫師評估之後，如需預防性用藥，處方以三天為限，於上班時間後再掛感染科門診開立處方，(預防性投藥儘量不要超過72小時)，並於上班時間後再看感染科門診開立處方。

附註五：HIV Ag/Ab Combo test項目，不用填寫「愛滋病毒篩檢志願書」，也不用經病人同意，即可立即抽血。