




編號	22	名稱	<p style="text-align: center;"><b>核醫唾液腺掃描</b> <b>(Sialoscintigraphy)</b></p>	修訂日期	2019/09/20
				修訂版次	第11版
主要目的	<p>一、唾液腺功能評估，特別是口乾症狀之評估，例如：慢性唾液腺炎（如Sjogren's症候群）或接受頭頸部放射治療後。</p> <p>二、某些唾液腺腫瘤之鑑別診斷。</p>				
檢查流程	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 造影檢查前至少禁食3小時以上。</li> <li>2. 核醫科櫃檯報到後，櫃檯人員會先請您喝水，再至休息區等候，約30分鐘後會有人呼叫您的名字，通知您解小便，再至核醫造影室。</li> <li>3. 先平躺於檢查床，靜脈注射核醫藥物：Tc-99m pertechnetate。</li> <li>4. 注射後立即進行頭頸部前方連續造影，並於15分鐘時給予您口含維他命C片，隨後再連續造影15分鐘。整個檢查需時約30分鐘。</li> <li>5. 造影檢查時，只需靜靜躺著，鏡頭會貼近您的臉部以獲得更好的影像品質，並不會壓迫或撞到您，也不會痛苦。</li> </ol>				
					
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 若您有懷孕的可能，可能暫時不宜進行本項檢查，請事先告知我們。</li> <li>2. 接受維他命C片時，片錠含在口中，口水自然吞下。</li> <li>3. 造影檢查過程，並不會痛苦，請儘量不動，特別是頭部，如此可以提高影像的品質。</li> <li>4. 建議於檢查結束後多喝水、多上廁所，以促進核醫藥物的排泄。</li> <li>5. 在造影前先解小便，請注意避免尿液污染到衣褲及皮膚。</li> <li>6. 本項檢查罕見有過敏等副作用。</li> <li>7. 本項檢查所用藥物雖具放射性，其半衰期只有6小時且非常微量，基本上並不會對您或家人造成傷害，請放心。但為維護兒童與孕婦之權益，注射後24小時內請盡量減少近距離相處（一公尺以內稱近距離）。</li> </ol>				

有任何疑問歡迎與核醫科聯絡：

聯絡電話：04-23592525轉4801

Email：nm@vghtc.gov.tw