

			臺 中 榮 民 總 醫 院 Taichung Veterans General Hospital		核子醫學科 衛 教 單		
編號	22	名稱	核醫唾液腺掃描 (Sialoscintigraphy)			修訂日期	2025/01/01
						修訂版次	第13版
主要目的		一、唾液腺功能評估，特別是口乾症狀之評估，例如：慢性唾液腺炎（如Sjogren's症候群）或接受頭頸部放射治療後。 二、某些唾液腺腫瘤之鑑別診斷。					
檢查流程		1. 造影檢查前至少禁食3小時以上。 2. 核醫科櫃檯報到後，請到叫號機插健保卡抽取號碼牌，並請依照語音指示進行後續檢查流程，先至第4造影室報到機插卡報到，請再回休息區等候。 3. 檢查前須喝約100~200毫升的水。 4. 輪到您時（約30分鐘後），叫號系統會呼叫您的號碼，通知您解小便，再至核醫造影室。 5. 如廁後請至造影室。依放射師指示平躺於檢查床，靜脈注射核醫藥物：Tc-99m pertechnetate。 6. 注射後立即進行頭頸部前方連續造影，並於15分鐘時給予您口含維他命C片（不可吞食），隨後再連續造影15分鐘。整個檢查需時約30分鐘。 7. 造影檢查時，只需靜靜躺著，鏡頭會貼近您的臉部以獲得更好的影像品質，並不會壓迫或撞到您，也不會痛苦。					
							
注意事項		1. 若您有懷孕的可能，可能暫時不宜進行本項檢查，請事先告知我們。 2. 接受維他命C片時，片錠含在口中，不可吞食，口水自然吞下。 3. 造影檢查過程，並不會痛苦，請儘量不動，特別是頭部，如此可以提高影像的品質。 4. 在造影前先解小便，請注意避免尿液污染到衣褲及皮膚。 5. 建議於檢查結束後多喝水、多上廁所，以促進核醫藥物的排泄。 6. 本項檢查罕見有過敏等副作用。 7. 本項檢查所用藥物雖具放射性，其半衰期只有6小時且非常微量，基本上並不會對您或家人造成傷害，請放心。但為維護兒童與孕婦之權益，注射後24小時內請盡量減少近距離相處（一公尺以內稱近距離）。					
有任何疑問歡迎與核醫科聯絡： 聯絡電話：04-23592525轉4801 Email：nm@vghtc.gov.tw							