新生兒黃疸 門診追蹤說明表

每週一,二,四,五下午門診時間(兩點至四點半)，可至本院婦幼大樓一樓門診護理站洽詢，我們會請專業醫師評估及檢查。(需帶嬰兒室新生兒出院評估單及母親健保卡，並需付掛號費 120 元)

流程

1. 先至 1 樓兒科門診護理站
2. 由護理人員使用經皮黃疸測試儀(請門診阿姨兩點帶下去給護理人員, 下午四點半回收至病嬰室)
3. 請護理人員將結果以及體重變化(當時體重- 出生體重/出生體重)x 100% 交給看健診的醫師
4. 請看診醫師以非常態門診看診

http://bilitool.org/

本網站(以 AAP 的 guideline 所架設而成) 可以用來判斷是否收住院及告知相關危險因子

將結果以及嬰兒出生日期時間(超過七天者皆以七天計算)輸入網站

結果有以下三種-

1. 經皮測試結果在 12mg/dl 以下且體重減輕小於 7-10%者，請醫師直接開皮膚黃疸測試檢驗單後，並輸入報告。給予衛教，請家屬持續在家觀察，告知追蹤時間看是否有危險因子。(此部分看 bilitool 的右邊欄位)
2. 經皮測試結果在 12mg/dl 以下但體重減輕超過 7-10%者，同 1 之處理，但額外轉至二樓產科門診接受哺乳衛教。.

3. 經皮測試結果在 12mg/dl 以上者，請醫師開扎腳跟血的 bil
同樣以網站 http://bilitool.org/之建議以及嬰兒是否有危險因子決定是否住院。若驗出之數值 小於一般照光之標準下 則按追蹤時間回診即可

Risk zone 指之後會有嚴重黃疸(bil>25 mg/dl)的危險性



依其建議安排追蹤時間
(以這個案如果有下列危險因子，原則上是 48 小時後追蹤),否則告知一般黃疸注意事項，滿月門診追蹤即可

紅色圈圈 是醫師要問清楚的 risk factor（這些 risk factor 可能會嚴重黃疸）
請把亞洲人此項去除



有核黃膽的危險因子(右側綠色圈圈中 標示的)

數值減二到三為住院標準(一般性照光)

Lower risk- 懷孕週數超過 38 周 且沒有核黃膽的危險因子
Medium risk- 懷孕週數超過 38 周 但有核黃膽的危險因子
或
懷孕周數小於 38 周 沒有核黃膽的危險因子
Higher risk- 懷孕周數小於 38 周 且有核黃膽的危險因子

藍色圈圈 表示 需要 intensive phototherapy 的數值
故此數值減 2-3 為 phototherapy *1set 的標準 亦為住院之標準

有需要住院者，請聯絡 SBR 或新生兒科總醫師
謝謝各位醫師的配合!