

本院須作 penicillin 皮膚試驗之抗生素

抗生素類別	Penicillins	Penicillins/ β -Lactamase inhibitors
注射劑型 (Injection)	<ul style="list-style-type: none"> * Ampicillin 500 mg/vial * Benzathine Penicillin (<i>Bicillin L-A inj 2.4MU[®]</i>) 2.4 MU/vial * Oxacillin (<i>Ocillina[®]</i> 500 mg/vial) * Piperacillin 2g/vial 	<ul style="list-style-type: none"> * Amoxicillin/Clavulanate (<i>Curam[®]</i>) 1.2 gm/vial * Ampicillin/Sulbactam (<i>Unasyn[®]</i>) 1.5 gm/vial * Piperacillin/Tazobactam (<i>Tazocin[®]</i> 2.25 gm/vial, <i>Tapimycin[®]</i> 4.5 gm/vial)

根據護理部「盤尼西林皮膚試驗法」標準作業流程，一個月內有做過皮膚試驗者，可以不用再做。

以下口服劑型可以不用做皮膚試驗
但使用上還是要小心是否有任何過敏症狀

抗生素類別	Penicillins	Penicillins/ β -Lactamase inhibitors
口服劑型 (Oral)	<ul style="list-style-type: none"> * Amoxicillin 250 mg/ cap * Amoxicillin(<i>Amolin[®]</i>) susp 50 mg/ml * Ampicillin 500 mg/ cap * Dicloxacillin 250 mg/cap (<i>Ziefmycin[®]</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> * Amoxicillin/Clavulanate (<i>Augumentin[®]</i> 1 gm/tab、 <i>Curam[®] susp</i> 312.5 mg/5 ml) * Sultamicillin tosylate (<i>Unasyn[®]</i>) 375mg/tab

臺中榮總藥學部: 2017.03 更新