





編號	17	名稱	核醫食道穿流掃描(固體或液體食物) Esophageal Transit Scan (Solid or Liquid)	修訂日期	2019/09/20
主要目的			一、評估食物在食道中移動的情形。 二、分開評估上、中、下三段食道的功能。		
檢查流程			<p>1. 檢查前至少禁食 4 小時以上。</p> <p>2. 核醫科櫃檯報到後，請至等候區等候，輪到您時會有人呼叫您的名字。</p> <p>3. 依固體食物或液體食物執行下列流程：</p> <p>A. 固體食物: 造影時，依技術師指示平躺在檢查床(臥姿檢查)或站立背靠造影偵測器(立姿檢查)，技術師會給您一小口煎蛋(已標記 Tc-99m 之藥物，例如 DTPA)，請您充分咀嚼後，一口吞下，連續造影約 2 分鐘，即完成檢查。依據吞嚥狀況，可能會重複檢查一次。</p> <p>B. 液體食物: 造影時，依技術師指示平躺在檢查床(臥姿檢查)或站立背靠造影偵測器(立姿檢查)，技術師會給您一小口液體(已標記 Tc-99m 之藥物，例如 DTPA)，請您一口吞下，連續造影約 2 分鐘，即完成檢查。依據吞嚥狀況，可能會重複檢查一次。</p>		
 					
注意事項			<p>1. 若您有懷孕的可能，可能暫時不宜進行本項檢查，請事先告知我們。</p> <p>2. 建議不要穿戴有金屬物的衣服及配件(如：項鍊)。</p> <p>3. 建議於注射後多喝水、多上廁所，以促進核醫藥物的排泄。</p> <p>4. 造影檢查過程，並不會痛苦，請儘量不動，如此可以提高影像的品質。</p> <p>5. 本項檢查罕見有過敏等副作用。</p> <p>6. 本項檢查所用藥物雖具放射性，其半衰期只有6小時且非常微量，基本上並不會對您或家人造成傷害，請放心。但為維護兒童與孕婦之權益，檢查 24 小時內請盡量減少近距離相處(一公尺以內稱近距離)。</p>		
<p>有任何疑問歡迎與核醫科聯絡： 聯絡電話：04-23592525轉4801      Email：nm@vghtc.gov.tw</p>					