


		臺 中 榮 民 總 醫 院 Taichung Veterans General Hospital		核子醫學科 衛 教 單		
編號	17	名稱	核醫食道穿流掃描(固體或液體食物) Esophageal Transit Scan (Solid or Liquid)		修訂日期	2025/01/01
					修訂版次	第12版
主要目的		一、評估食物在食道中移動的情形。 二、分開評估上、中、下三段食道的功能。				
檢查流程		1. 檢查前至少禁食 4 小時以上。 2. 櫃檯報到後，請到叫號機插健保卡抽取號碼牌，並請依照語音指示進行後續檢查流程，先至第4造影室插卡報到，再至休息區等候。 3. 輪到您時，叫號系統會呼叫您的號碼，請至核醫造影室。 4. 依固體食物或液體食物執行下列流程： A. 固體食物：造影時，依放射師指示平躺在檢查床（臥姿檢查）或站立背靠造影偵測器（立姿檢查），放射師會給您一小口煎蛋（已標記 Tc-99m 之藥物，例如 DTPA），請您充分咀嚼後，一口吞下，連續造影約 2 分鐘，即完成檢查。依據吞嚥狀況，可能會重複檢查一次。 B. 液體食物：造影時，依放射師指示平躺在檢查床（臥姿檢查）或站立背靠造影偵測器（立姿檢查），放射師會給您一小口液體（已標記 Tc-99m 之藥物，例如 DTPA），請您一口吞下，連續造影約 2 分鐘，即完成檢查。依據吞嚥狀況，可能會重複檢查一次。				
		 				
注意事項		1. 若您有懷孕的可能，可能暫時不宜進行本項檢查，請事先告知我們。 2. 建議不要穿戴有金屬物的衣服及配件(如：項鍊)。 3. 建議於注射後多喝水、多上廁所，以促進核醫藥物的排泄。 4. 造影檢查過程，並不會痛苦，請儘量不動，如此可以提高影像的品質。 5. 本項檢查罕見有過敏等副作用。 6. 本項檢查所用藥物雖具放射性，其半衰期只有6小時且非常微量，基本上並不會對您或家人造成傷害，請放心。但為維護兒童與孕婦之權益，檢查24小時內請盡量減少近距離相處（一公尺以內稱近距離）。				
有任何疑問歡迎與核醫科聯絡： 聯絡電話：04-23592525轉4801 Email：nm@vghtc.gov.tw						