

刺激性(Irritant)及起皰性(Vesicant)化療藥物外滲處理建議

臺中榮總藥學部化藥室
2020/05/26 更新

分類	藥名	外滲處理
起皰性－蔥環類	Doxorubicin	冷敷 20 分鐘，每 6 小時 1 次，持續 3 天。
	Epirubicin	
	Idarubicin	立即冷敷 30 分鐘，之後每次 30 分鐘，每 6 小時 1 次，持續 3 天。
起皰性－抗生素類	Mitomycin-C	冷敷 20 分鐘，每 6 小時 1 次，持續 1-2 天。
	Dactinomycin	冷敷 15-20 分鐘，每 6 小時 1 次，持續 1-3 天。
刺激性/起皰性－抗代謝類	Mitoxantrone	抬高患部及冷敷 20 分鐘，每 6 小時 1 次，持續 1-2 天。。
起皰性－植物鹼類	Vinblastine	溫敷 20 分鐘，每 6 小時一次，持續 1-2 天。
	Vincristine	
	Vinorelbine	
刺激性/起皰性－烷基化合物類	Cisplatin (藥物濃度 >0.5mg/ml 且外滲容量 >20ml，可能產生組織壞死)	Cisplatin－冷敷，每 8 小時 1 次，每次 60 分鐘，持續 3 天。
起皰性－紫杉醇類	Paclitaxel	溫敷 15~20 分鐘，每天至少 4 次，持續 1~2 天。
	Docetaxel	
	Cabazitaxel	冷敷 15-20 分鐘，每 6 小時 1 次，持續 1 天。
	nab-paclitaxel	
刺激性－蔥環類	Liposomal Doxorubicin	冷敷 30 分鐘
刺激性－抗代謝類	Fluorouracil	冷敷 15-20 分鐘，每 6 小時 1 次，持續 1 天。
	Gemcitabine	
刺激性－抗生素類	Etoposide	溫敷 30-60 分鐘，每隔 15 分鐘重複 1 次，持續 1 天。
	Bleomycin	冷敷 15-20 分鐘，每 6 小時 1 次，持續 1 天。
刺激性－拓撲異構酶抑制劑	Irinotecan	冷敷 15-20 分鐘，每 6 小時 1 次，持續 1 天。
	Irinotecan, liposomal	
	Topotecan	冷敷 15-20 分鐘，每 6 小時 1 次，持續 1 天。

刺激性(Irritant)及起皰性(Vesicant)化療藥物外滲處理建議

臺中榮總藥學部化藥室
2020/05/26 更新

分類	藥名	外滲處理
刺激性－烷基化合物類	Ifosfamide	冷敷，每 8 小時 1 次，每次 60 分鐘，持續 3 天。
	Carboplatin	
	Oxaliplatin	Oxaliplatin－外滲部位溫敷 1 小時或局部冷敷。
	Carmustine	冷敷 20 分鐘，每 6 小時一次，持續 1-2 天。
	Cyclophosphamide	抬高患部及冷敷 20 分鐘，每 6 小時 1 次，持續 1 天。。
	Dacarbazine	冷敷 20 分鐘，每 6 小時 1 次，持續 1-2 天。
	Melphalan	冷敷 15-20 分鐘，每 6 小時 1 次，持續 1 天。