

多劑量包裝藥品之安定性

藥物名稱	未開封 冷藏	開封後儲存期	備註
口服製劑			
Brown Mixture liquid 120mL (B.M. solution)		1 個月(本部建議)	仿單上未載明
Clodrin oraL soln 10% 30mL (Chloral Hydrate)		1 個月	開封後之保存期限為 30 天，儲存溫度為 25℃，未使用完應丟棄
Cardiacin elixir 60mL (Digoxin elixir)		1 個月(本部建議)	
Degastom susp 2% 300mL (Simethicone susp 20mg/mL)		3 個月(本部建議)	
Duphalac syrup 300mL (Lactulose syrup 667mg/mL)		1 個月(廠商建議)	使用中須密封保存，若顏色變深或透明度降低，應丟棄
(液) Fycompa oraL susp 0.5mg/mL (Perampanel 170mg/340mL)		90 天	開封後儲存溫度勿超過 30℃。
Ferrum drops 30mL (Ferric hydroxide polymaltose)		90 天(廠商建議)	30℃ 避光保存
(液) Isobide soln 500mL (Isosorbide oraL soln 700mg/mL)		1 個月	開封後，應密封保存於冷處；安定性為 1 個月。
(液) Keppra soln 100mg/mL, 300mL (Levetiracetam soln)		2 個月	
Megest oraL susp 4% 120mL (Megestrol susp 40mg/mL)		1 個月	室溫 25℃ 以下儲存，遠離高溫或陽光照射
Nitrostat tab 0.6mg 25's (Nitroglycerin)		開封後 6 個月 (本部建議)	藥品需貯存於原有的玻璃容器中，使用後立即將瓶蓋拴緊，並存放在乾燥陰涼處。
Nystatin + D5W 250mL		3 天(2-8℃)	泡製後建議冷藏。
(液) Sandimmun NeoraL 100mg/mL (Cyclosporin NeoraL soln)		2 個月	
(液) Trileptal susp 6% 100mL (Oxcarbazepine susp 60mg/mL)		7 週(30℃ 以下)	30℃ 以下儲存。
兒科糖漿製劑		1 個月(本部建議)	
兒科口服抗生素水劑			
Ulexin oraL susp 2.5% 60mL (Cephalexin susp 25mg/mL)		7 天(2-8℃)	第一次使用前加冷開水至 60cc 刻度，服用前需搖勻。
(液) Curam susp 312.5mg/5mL, 60mL (Amoxicillin, Clavulan 312.5mg/5mL)		7 天(2-8℃)	須先加水至瓶身凹陷標記處，並充分振搖溶解，每次使用前也需搖勻。
(液) Zithromycin susp 600mg/15mL (Azithromycin susp 600mg/15mL)		10 天(室溫)	須先加 9 ml 水，稀釋後為 15ml，並充分振搖溶解，室溫下可保持穩定 5 天。
Mycostatin oraL susp 24mL (Nystatin oraL susp 100,000 U/mL)		7 天(室溫)	須先加 23ml 水稀釋，並充分振搖溶解，每次使用前也需搖勻。

多劑量包裝藥品之安定性

藥物名稱	未開封 冷藏	開封後儲存期	備註
注射劑型			
Alvosteo inj 2.4mL (Teriparatide 20mcg/ 80mcL/ dose)	*	28 天(2-8°C)	2-8°C 冰箱儲存，不可冷凍，注射後儘速放回冰箱。
(IU計價) Botox inj 1U (Botulinum toxin type A inj)	*	72 小時(配製後冷藏)	不含保存劑，原瓶須冷藏。
Dysport inj 1U (Clostridium botulinum type A)	*	24 小時(配製後冷藏)	不含保存劑，原瓶須冷藏。
Forteo inj 2.4mL (Teriparatide 20mcg/ 80mcL/ dose)	*	28 天(2-8°C)	2-8°C 冰箱儲存，不可冷凍，注射後儘速放回冰箱。
5.3mg Genotropin inj (Somatropin inj 5.3mg(16IU))	*	28 天(2-8°C)	配製前 2-8°C 儲存，在 25°C 之下保存最多一個月。調配後冰箱避光可保存 28 天。
GonaL-F inj 300IU/ 0.5mL (Follitropin alfa (r-hFSH))	*	28 天(25°C 以下)	原包裝 2-8°C 冰箱避光儲存，第一次使用後，可放冰箱內或 25°C 以下避光儲存，最長 28 天。
12mg GoQuick Genotropin inj (Somatropin inj 12mg(36IU)/1mL)	*	28 天(2-8°C)	原包裝 2-8°C 冷藏避光儲存，調配後冷藏避光可保存 28 天。
1000U/mL Heparin inj 5mL 5000U/mL Heparin inj 5mL		28 天(2-8°C)	含有保存劑 (Benzyl alcohol)
Humatrope inj 12mg(36IU) (Somatropin inj)	*	28 天(2-8°C)	稀釋後 2-8°C 儲存
Insulin inj	*	請參考藥品手冊內容	含有保存劑 (m-Cresol, Phenol)
Lidophrine inj 2% 20mL (Lidocaine inj 2% & Epinephrine)		3 天(15°C 以下)	含有保存劑 (Methyl-parahydroxybenzoate)， 15°C 以下儲存並避光。
Norditropin inj 10mg/1.5mL (Somatropin)	*	28 天(2-8°C) 14 天(30°C 以下)	開封後 2-8°C 保存達 4 週、或 30°C 達 14 天。
Omnitrope inj 5mg(15IU)/1.5mL (Somatropin)	*	28 天(2-8°C)	儲存於冰箱 2-8°C，可冷藏 28 天，不可冰凍，需避光儲存。
Puregon inj 300IU/ 0.36mL (Follitropin beta)	*	28 天(25°C 以下)	原包裝 2-8°C 冰箱避光儲存，開始使用後可儲存於 25°C 以下，並於 28 天內使用完畢。
Saizen inj 12mg(36IU)/1.5mL (Somatropin)	*	28 天(2-8°C) 7 天(25°C 以下)	離開冰箱於室溫 25°C 最長 7 天。
Saxenda inj 18mg/3mL (Liraglutide)	*	30 天(30°C 以下)	未使用前 2-8°C 冷藏，第一次使用後 30°C 以下儲存。
40mg/mL Shincort IM 1mL (Triamcinolone inj)		7 天 (廠商建議)	
Victoza inj 18mg/3mL (Liraglutide)	*	30 天(30°C 以下)	未使用前 2-8°C 冷藏，第一次使用後 30°C 以下儲存。

多劑量包裝藥品之安定性

藥物名稱	未開封 冷藏	開封後儲存期	備註
2% Xylocaine inj 20mL (Lidocaine inj)		3 天(25°C 以下)	含有保存劑 (Methyl-parahydroxybenzoate) ,室 溫 25°C 以下儲存。
外用藥			
一般眼藥水或眼藥膏		1 個月(本部建議)	詳細個別資料請參考藥品手冊內容
一般耳滴劑		1 個月(本部建議)	詳細個別資料請參考藥品手冊內容
外用藥膏		6 個月	不建議分裝
部分外用藥特殊安定性如下			
Allergocrom nasaL 2.8mg 100dose (Cromolyn sodium)		6 週(25°C 以下)	25°C 以下陰乾處儲存
Cromo eye drops 2% 10mL (Cromolyn sodium)		6 週	需避免陽光、日光燈照射
(Inhaler) Foster 120dose (Beclomethaso,Formoterol)	*	3 個月(25°C 以下)	未開封前請儲存於冰箱 (2-8°C) ,開 封使用後, 25°C 以下儲存。
Synbufo inhaler 120dose (Budesonide,Formoterol)		3 個月(30°C 以下)	30°C 以下儲存
Trimbow inh 100/6/12.5mcg 120dose (Beclomethasone/Formoterol/ Glycopyrronium bromide)	*	4 個月(25°C 以下)	未開封保存於 2-8°C , 開封使用後, 25°C 以下儲存。
Vyzulta oph soln 0.024% 5mL (Latanoprostene bunod)	*	8 週(25°C 以下)	未開封保存於 2-8°C , 開封使用後, 25°C 以下儲存。
顯影劑			
Xenetix inj 350mg/100mL (Iobitridol inj)	--	目前無開封後之安定性 數據, 建議開封後建議 盡速使用完畢。	廠商回復
Omnipaque inj 350mg I/mL,100mL (IohexoL inj)	--	結束一天的工作後, 剩 餘之藥品應丟棄	仿單載明
Iopamiro-370 inj (IOPAMIDOL INJ 755.2MG/MLX100ML)	--	開瓶 10 小時後未使用 的藥品應丟棄	Micromedex
Ultravist inj 370mg I/mL,100mL (Iopromide inj)	--	開瓶 10 小時後未使用 的藥品應丟棄	仿單載明
護理站消耗性外用藥品			
Alcohol 95% 4000mL (Ethyl alcohol)		減少開瓶次數及時間可 放至效期。	因所含成分易揮發保持乾燥, 遠離火 源, 日照, 潮濕, 儘早用畢。
Andine alcoholic soln 10% 500mL (Povidone-iodine soln)		使用期限 1 個月	含酒精, 遠離火源、日照、潮濕, 開 封後避免汙染、減少開瓶次數及時 間。

多劑量包裝藥品之安定性

藥物名稱	未開封 冷藏	開封後儲存期	備註
Antigerm soln 4% 5,000mL-PBF (Chlorhexidine gluconate)		原桶開封未汙染到原溶液，可用至有效期限；分裝瓶建議使用期限 6 個月。	在室溫(25°C 以下)、避光、乾燥環境中貯存，且使用後立即旋緊瓶蓋。
200mL Aqua easy antiseptic 2% (Chlorhexidine gluconate)		使用期限 1 個月	開封後在室溫、避光、乾燥環境中貯存，開封後避免汙染、減少開瓶次數及時間。
Cleansing alcohol soln 75% 500mL (Ethyl alcohol)		使用期限 6 個月	開封後保持乾燥，遠離火源、日照、潮濕，因所含成分易揮發開封後減少開瓶次數及時間。
200mL Easy antiseptic liquid 2% (Chlorhexidine gluconate)		使用期限 1 個月	含酒精，遠離火源、日照、潮濕，開封後避免汙染、減少開瓶次數及時間。
Green Anti-bacterial Hand 500mL (Ethyl alcohol)		使用期限 6 個月	開封後保持乾燥，遠離火源、日照、潮濕，因所含成分易揮發開封後減少開瓶次數。
Hydrogen Peroxide soln 3% 450mL (雙氧水)		使用期限 6 個月	開封後在室溫(25°C 以下)、避光、乾燥環境中貯存，開封後減少開瓶次數及時間。
Lido jelly 2% 30Gm (Lidocaine)		使用期限 3 個月	開封後在室溫、避光、乾燥環境中貯存，開封後避免汙染。
Lido-anes spray 10% 50mL (Lidocaine)		使用期限 3 個月	開封後在室溫、避光、乾燥環境中貯存，開封後避免汙染。
Normal Saline 沖洗用		一天內丟棄	開封後保持陰涼乾燥。
Polvidine soln 10% 250mL (Povidone-Iodine)		使用期限 1 個月	開封後在室溫(25°C 以下)、避光、乾燥環境中貯存，開封後避免汙染。
200Gm Sulfasil cream 1% (Sulfadiazine silver)		使用期限 1 個月	開封後在室溫、避光、乾燥環境中貯存，開封後避免汙染。

*:未開封需冷藏，開封後依建議條件儲存。

藥學部 2024 年 7 月更新