

## 多劑量包裝藥品之安定性

藥物名稱	冷藏	開封後儲存期	備註
<b>口服製劑</b>			
(C) B.M. solution		1 個月(本部建議)	仿單上未載明
10%Chloral Hydrate		1 個月	開封後之保存期限為 30 天，儲存溫度為 25℃，未使用完應丟棄
Cyclosporin Sol'n 50ml (Sandimmun®)		2 個月(仿單建議)	
Digoxin elixir 50ug/60ml (Cardiacin®)		1 個月(本部建議)	
Isosorbide oral solution 700 mg/mL, 500mL/bot (SOL'N Isobide 500mL)		1 個月	開封後，應密封保存於冷處；安定性為 1 個月。
Kepra sol 100mg/ml		2 個月(仿單建議)	
Lactul syr. 300ml		1 個月(廠商建議)	使用中須密封保存，若顏色變深或透明度降低，應丟棄
Megest susp		1 個月	室溫 25℃ 以下儲存，遠離高溫或陽光照射
Neutral phosphate		稀釋後 1 個月	放冰箱內會有結晶析出
Nitrostat tab 25's		開封後 6 個月(本部建議)	藥品需貯存於原有的玻璃容器中，使用後立即將瓶蓋拴緊，並存放在乾燥陰涼處。
Nystatin + D5W 250mL	*	3 天	
Posaconazole susp 40mg/mL (PosanoL®)		4 週(仿單建議)	
Trileptal® susp 6% 100ml		7 週	
Wilcon susp 20mg/ml 60 mL/bot (Simethicone)		3 個月(本部建議)	
兒科糖漿製劑		1 個月(本部建議)	
<b>兒科口服抗生素水劑</b>			
Amoxicillin 50mg/ml <b>Amolin® oral susp 60ml</b>	*	7 天	須先加水至藥瓶上 60ml 之刻度，並充分振搖溶解，每次使用前也需搖勻
Cephalexin susp 1.5g, <b>Ulexin® oral susp 60mL</b>	*	7 天	第一次使用前加冷開水至 60cc 刻度，服用前需搖勻
Amoxicillin 250 mg + Potassium clavulanate 62.5mg / 5ml <b>Curam® oral susp 60ml</b>	*	7 天	須先加水至瓶身凹陷標記處，並充分振搖溶解，每次使用前也需搖勻
Azithromycin 200 mg/5 ml <b>Zithromax® susp 15ml</b>		10 天	須先加 9 ml 水，稀釋後為 15ml，並充分振搖溶解，每次使用前也需搖勻
Clarithromycin 125 mg/5 mL <b>Klaricid® susp 70ml</b>		14 天	第一次使用前加冷開水 37 ml 搖勻，稀釋後 25℃ 可保存 14 天，請勿冷藏。
Mycostatin susp 100,000 U/ml <b>Nystatin 24ml</b>		7 天	須先加 23ml 水稀釋，並充分振搖溶解，每次使用前也需搖勻
<b>注射劑型</b>			

## 多劑量包裝藥品之安定性

藥物名稱	冷藏	開封後儲存期	備註
B-complex inj	*	14 天 (廠商建議)	含有保存劑，開封後須冷藏 (Benzyl alcohol)
Botox(Botulinum toxin Type A)	*	72 小時(配製後冷藏)	不含保存劑，原瓶須冷藏。
Dysport®	*	24 小時(配製後冷藏)	不含保存劑，原瓶須冷藏。
Heparin inj	*	28 天	含有保存劑 (Benzyl alcohol)
Insulin inj	*	28 天	含有保存劑 (m-Cresol, Phenol)
Shincort inj 5ml		7 天 (廠商建議)	
Trace element inj	*	14 天 (廠商建議)	含有保存劑 (Benzyl alcohol)
2% Xylocaine & Epinephrine inj	*	3 天	含有保存劑(Methyl-parahydroxybenzoate)，15°C 以下儲存並避光。
2% Xylocaine inj 20mL (vial 包裝)	*	3 天	含有保存劑(Methyl-parahydroxybenzoate)，室溫 25°C 以下儲存。
<b>眼藥水或眼藥膏</b>			
		建議開封後 1 個月	
<b>顯影劑</b>			
lobitriol inj soln 767.8mg/ml (350mg iodine/ml) <b>Xenetix 350/100ml/bot</b>	--	開瓶 10 小時後未使用的藥品應丟棄(本部建議)	仿單上未載明
lohexol inj soln 755mg/ml (350mg iodine/ml) <b>Omnipaque 350/100ml/bot</b>	--	結束一天的工作後，剩餘之藥品應丟棄	仿單載明
lopamidol inj soln 755.3mg/ml (370mg iodine/ml) <b>lopamiro 370/100ml/bot</b>	--	開瓶 10 小時後未使用的藥品應丟棄	Micromedex
lopromide inj soln 769mg/ml(370mg iodine/ml) <b>Ultravist 370 /100ml/bot</b>	--	開瓶 10 小時後未使用的藥品應丟棄	仿單載明

\*:建議冷藏 藥學部 2021 年 4 月更新